


卷
四

吉慶堂



十日風雨



BGA2936

U.3

吳興

金德生

聞風

父

輯著

白嶽

曹敬祚

長

胤父訂

正

正

濟陰綱目卷之四

吳興 金德生聞風父輯著 白嶽 曹啟祥長胤父訂正

西陵 汪 淇 澹漪子箋釋 天都 查 望千周父參閱

虛勞

論婦虛勞與男子不同

補中益氣是治勞倦內傷之劑乃初治法非久病勞療骨蒸所宜

精血雖殊而虛勞形症不遠治亦不異宜與雜症參

準繩云。勞倦所傷。用補中益氣湯調治。乃暴病也。失治而有發熱。潮熱盜汗。欬嗽諸證出焉。謂之虛勞。又復失治。而有皮聚毛落。飲食不為肌膚。骨髓中熱。經閉不行。諸證出焉。謂之癆。骨蒸熱。至於傳尸之疾。別自一種。其源不起於勞欲。其流或至於滅門。余於雜病首冊。則既條分而備列矣。然男以精為主。女以血為主。其致病既殊。其施治亦異。故應別著方法。而陳氏良方分勞癆骨蒸勞血

看
按血風勞者
用血虛而風
熱成勞也風
勞冷勞因虛
乘襲日久變
成勞熱氣虛
者氣不足熱
勞者血不足
至骨蒸勞瘵
大都難治矣

風勞氣虛勞風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無遺少之患矣

○論初病大法

保命集云治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛也

戴氏曰有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈交生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯卽香附末

無執虛勞乃

陽虛症其病

自上而下損

之脈也法宜

溫補惟東垣

元禮立齋先

主獨得其治

宜宗之氣虛

易補宜早為

妙不比有熱

虛勞之難療

○論無執虛勞

大全云婦人冷勞屬血氣不足臟腑虛寒以致臍下冷痛手足時

寒月經失常飲食不消或時嘔吐惡寒發熱骨節痠疼肌膚羸瘦

面色痿黃也

薛氏曰前證有內外真寒有內外真熱有內真熱而外假寒有內

真寒而外假熱著若飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食畏寒手

足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之證也宜用附子理中

湯以回陽八味地黃丸以壯火若飲食如常大便堅實胸腹痞脹

飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不畏風寒此內外真熱之證也宜

用黃連解毒湯以消陽六味丸以壯水若飲食如常大便堅實胸

腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內真熱而外

假寒也。亦用解毒湯六味丸。若飲食少思。大便不實。吞酸噯氣。胸腹痞滿。手足逆冷。面赤嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假熱也。亦用附子理中湯與八味丸。當求其屬而治之。經曰。益火之源以消陰翳。壯水之主以制陽光。使不知真水火之不足。泛以寒熱藥治之。則舊疾未去。新病復生矣。夫所謂屬者。猶主也。謂心腎也。求其屬也者。言水火不足而求之於心腎也。火之源者。陽氣之根。即心是也。水之主者。陰氣之根。即腎是也。非謂火為心源。為肝。水為腎主。為肺也。

以內外俱寒而不用附子理中何也。以內外真熱不用三黃解毒而以二味。

一婦食少作嘔。口吐痰涎。面黃腹痛。月經不調。手足逆冷。此內外俱寒之證。以六君加香附木香治之而癒。一婦忽嘔吐酸水。內熱作渴。飲食不進。惟喜冷水。面色青赤。投之

之源也。其餘如白朮等藥。

以藥入口即吐。此內外真熱之證。精十餘日。以黃芩一味。煎而服之。以藥入口即吐。此內外真熱之證。精十餘日。以黃芩一味。煎而服之。

黃連者瀉火之源也其餘如白朮等藥者抑恐苦寒傷胃耳有熱渴便秘二症故雖逆冷亦是假寒然亦有可下者后用六味丸求其屬也然須以脈有力無力分虛實

此得熱因寒用之法從之

以藥入口卽吐此內外真熱之證積十餘日以黃連一味煎湯飲之徐加白朮茯苓仍加陳皮當歸炙甘草至月餘始進米飲稀粥調理而瘳

一婦內熱作渴大便秘結畏惡風寒手足逆冷此內真熱而外假寒先用黃連解毒湯後用六味丸而瘳

一婦初患痰喘熱渴醫以降火散氣治之肌日削而氣日索延至甲辰木旺痰盛身熱口腐腹脹神昏絕食幾死此虛熱無火投以壯火生土之劑隨服隨效越數歲夏初坐則頭墜不能起視臥則背冷覺風透體煩熱暈眩咳嘔痰湧手足麻冷此內真寒外假熱之證也遂以大補薑附之劑投之不三四服而大勢已平仍以前藥加減而瘳

此條已見帶下
此重復引證也

明是上實下
虛

得熱因寒用

韓懋治其嫂年三十餘十八胎九員八天會家難作驚憂過甚遂
昏昏不省人事口唇舌皆瘡或至封喉下部虛脫白帶如注如此
四十餘日或時少甦至欲自縊悲不能堪醫或投涼劑解其上則
下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥熏蒸其下則熱暈欲絕此亡陽
證也急以鹽煮大附子九錢爲君制以薄荷防風佐以芎歸薑桂
之屬水煎入井冰冷與之未盡劑即睡通竅覺即能識人或曰此
何謂也曰方書有之假對假真對真爾上乃假熱故以假冷之藥
從之下乃真冷故以真熱之藥從之斯上下和而病解矣繼以女
金丹錯綜以三二方不但去其疾且調治元氣無何連生二子
以上論及治驗有無當於虛勞者而實治寒與熱變通之太法
爾不可不察也

不可不察也

○論有熱虛勞。此屬陰虛。乃自下而上至脈之病也。宜以丹溪立

先無形而後有形也。且滋陰之劑。有害脾胃。脾傷則氣損。氣損則血無以生。氣盛則火有所助。誠難調治。惟審胃氣有無。以決治則。此為良法耳。

大全云。婦人熱勞。由心肺壅熱。傷於氣血。以致心神煩躁。煩赤頭

疼。眼澀。唇乾。口舌生瘡。神思昏倦。四肢壯熱。飲食無味。肢體疼痛。

心忪盜汗。皮膚目瘦。或寒熱往來。當審其所因。調補氣血。其病自

愈矣。

薛氏曰。熱勞乃壯火食氣。虛火煎熬真陰之所致也。王太僕云。如

大寒而其熱之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。是

無火也。當治其心。如大熱而其寒之不寒。是無水也。熱動復止。倏

忽往來時動時止。是無水也。當助其腎。心盛則生熱。腎甚則生寒。

壯火食氣是言實火非同勞熱之火可補
太僕所論乃真水真火此根有生中來故當原屬以

寢之
竊謂以下諸
或肺或肝或脾
者其少經以
分氣分血主
治亦與本屬
之意不同
此下三節
分經虛實
定方確有見
解

腎虛則寒動於中心虛則熱收於內竊謂前證若肝脾血虛用四
物參朮肝脾鬱怒小柴胡合四物湯脾胃氣虛補中益氣湯肝脾
血虛加味逍遙散肝經風熱加味小柴胡湯心經血虛天王補心
丹肺經氣虛人參補肺湯肝經血虛加味四物湯大抵午前熱屬
氣分用清心蓮子飲方見雜病赤白濁午後熱屬血分用四物湯參朮牡
丹皮熱從左邊起肝火也實則四物湯龍膽山梔虛則四物參朮
黃耆熱從臍下起陰火也四物參朮黃耆知母酒拌炒黑五味子
麥門冬肉桂如不應急用加減八味丸不時而熱或無定處或從
腳心起此無根虛火也用加減八味丸及十全大補湯加麥門五
味主之

一婦經行不調飲食少思目瞢熱甚此肝脾氣血俱虛用十全大

補加山茱萸山藥牡丹皮麥門五味而痛。久年秋寒熱如瘧。仍用
前藥而痛。一婦生育多胎。經月不調。兩足發熱。年餘其身亦熱。勞
則足痠痛。又年許唇腫裂痛。又半年唇裂見血。形體瘦削。飲食無
味。月水不行。此氣血俱衰之證。彼誤用通經丸等藥。復傷氣血。遂
致不起。

○論瘵骨蒸熱

瘵有鬼鬼病
瘵。發瘵字
從之。昌氏吟
方有瘵瘵法
有以瘵瘵夜
半。瘵瘵北斗
者。皆瘵瘵法
也。若果有瘵
鬼。亦必是瘵
鬼。為瘵藥石

非繩云。五勞六極七傷。諸證治已見。雜病虛勞門。茲不贅敘。婦人
致此。多因經行胎產。或飲食起居七情。重傷肝脾之所致。又或失
於調攝。或過於攻伐而成。與男子治法稍有不同。故彙集古禁方。
專治婦人者於此。若欲窮其源流。更當稽之彼籍。
良方云。骨蒸勞者。由積熱附於骨而然也。亦曰傳尸。殭瘵復連無

云何

此至臍之病

也。其主骨

骨至于蒸其

陰。其陽何

以後而傳戶

無。其是也

肝熱生風故

病名血風曰

勞者病久血

虛月候不行

而發熱不止

也

此是肝腎之

陰不足當從

至脈主治

勞陰經

卷八

事其名不一。此病皆由脾胃虧損所致。其形癰腫。腹脹泄痢。肢體無力。傳於腎則盜汗不止。腰膝冷痛。夢鬼交侵。小便赤黃。傳於心則心神忪悸。喜怒不時。煩唇赤色。乍熱乍寒。傳於肺則胸滿短氣。咳嗽吐痰。及肩甲錯傳於肝則兩目昏暗。脇下妨痛。閉戶忿怒。五臟既病則難治療。

論血風勞

太主云。婦人血風勞證。因氣血素虛。經候不調。或外傷風邪。內挾宿冷。致使陰陽不和。經絡否滯。腹中堅痛。四肢痠疼。月水或斷或來。面色痿黃羸瘦。又有因產後未滿百日。不謹將護。臟腑虛腫。白脉枯竭。遂致勞損。久不瘥。則變寒熱。休作有時。飲食減少。肌膚瘦瘠。遇經水當至。即頭目昏眩。胸背拘急。四肢疼痛。身體煩熱。足重。

而浮或經水不通故謂之血風勞也

薛氏曰東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故因熱懶行動作喘之表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐存養其氣以甘寒湯其熱氣以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之要略云平人脈大為勞以黃耆建中湯治之

一婦人勞則足跟執痛此是三陰血虛用聖愈湯而痊後遍身瘡癢誤服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺黃膽星為丸用四物麥門五味茶連炙甘草山梔柴胡煎送而瘡

此所謂風勞也當從損脈治
此下諸方於虛損初病者

一婦素清苦勤於女工因感風邪自用表散之劑反朝寒暮熱自

宜酌用之。夫血病治血，氣病治氣，人所易知，而血病補氣，氣病補血，人未盡知。故四物復有增損之法，益以地黃，補氣而損脾，非四肢怠惰，乏力少氣者所宜。故當損而人參甘草所益，脾也。故增若炮薑，既能溫中，又能引血以歸氣，此增損之妙也。

汗盜汗，形氣虛甚，其脉或浮洪或微細，其面或青白或痿黃，此邪去而氣血愈虛也。用十全大補湯三十餘劑，漸瘳。又用加味逍遙散，兼治半載而痊。

○治虛勞平補諸方

增損四物湯 治婦人氣血不足，四肢怠惰，乏力少氣，兼治產後下血過多，榮衛虛損，陰陽不和，乍寒乍熱。

當歸

川芎

白芍藥

人參

乾薑

炮薑

甘草 各等分

右以咀，每服四錢，水一盞，煎至六分，去滓，熱服。

六神湯

治脾氣不和，榮衛不足，怠惰困倦，不嗜飲食，服之補養。

真氣進美飲食，充澤肌膚。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

黃耆

地骨皮 各等分

按充肌澤膚者衛氣也。氣不可熱。此方以黃芪益衛氣而又以地骨皮清衛熱。則無壯火食氣之虞。又以四物引衛氣以歸四臟而生血。則又有少火生氣之用。如是則榮衛足而困倦去矣。其曰脾不和者。指食亦為氣不足之病。氣足則愈也。宜知之。

右為養榮湯。每服五錢。水煎。空心溫服。

聖愈湯。治血虛心煩。睡臥不寧。或五心煩熱。

黃耆

當歸酒洗各一錢

人參

川芎

熟地黃酒洗

生地黃

酒洗各五分

右水煎服。

加減大建中湯。

治婦人胎前產後一切虛損。月水不調。脘腹病

痛。往來寒熱。自汗口乾煩渴。

芍藥

二兩

當歸

川芎

黃耆

肉桂

各一兩

白朮

甘草

炙各七錢五分

右為末。每服二錢。加薑棗水煎服。食前。

當歸建中湯。治婦人一切血氣不足。虛損羸乏。

聖愈湯重在

血虛心煩

字然去白芍

而用生地者

所以涼心生

血也川芎之

用豈為火動

宜散散不聚

以麥門冬易

之

按前三方一

用參黃以溫

中一用黃芪

地骨以益衛

清熱以參芪

並用而中外

兩補均以西

物加減為血

分后多此名

疑中又重在

當歸四兩

白芍藥兩

肉桂去皮

甘草炙各二兩

右以咀每服三錢加生薑三片棗二枚水煎空心服

此方以歸芍為主而

無蒼米雖薑棗和中然在血分建業知配合之妙則知古人之心

雙和散治一切大病之後虛勞乏力補血益氣

黃耆

熟地黃

當歸

川芎

白芍藥

炒各一錢

肉桂

甘草

炙各五分

右以咀每服四錢加生薑三片棗二枚水煎服

補中益氣湯治形神勞倦或飲食失節以致脾胃虛損清氣下

陷發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦目漸羸弱

黃耆

人參

有嚙去之

白朮名一錢

甘草炙王

當歸

陳皮

各七分

升麻

柴胡

各三分

色可以通榮
血桂之氣味
可以通榮氣
故本經以之
通血脈又同
葦朮甘草薑
朮等則建中
之功尤大矣
以其兼中上
也雙和者專
和榮衛而非
建中意也然
即大建中湯
以白水易薑
地而分兩亦
殊要知古人
不執方不泥
法讀之令人
有言外之意

右作一服。水煎食遠稍熱服。

八珍湯。治脾胃虧損。氣血俱傷。益人之生以脾胃為主。脾胃一

虛諸臟失所。百病生焉。

即四君子合四物湯。加薑棗煎服。

歸脾湯。治脾經失血。少寐發熱盜汗。或思慮傷脾。不能攝血妄

行。或健忘怔忡驚悸。或心脾傷痛怠惰嗜臥。飲食不思。

方見血崩門。勞傷條。

黃耆散。治勞氣食後身疼痛。夜間盜汗。此因失血榮衛損也。

黃耆一兩

防風

當歸

白芍藥

乾地黃

各七錢五分

甘草炙半兩

右每服五錢。薑三片棗一枚。水煎食前溫服。

夫形勞者氣傷於外神勞者氣傷於內飲食不節者中氣受傷傷則水穀不化後天無病而上下二焦亦無所養故以甘溫之氣以益上中之氣而又妙在升藥以舉下陷之陽使藥衛和而氣自益也氣益則何病之有故東垣先生一生得力盡在于此其本方加

桔梗引子 治心不足解勞倦益血

黃耆

人參

麥門冬

心桔梗

甘草

炙各二兩青皮半兩

右為末每服三錢水一盞煎七分溫服

桔梗飲其氣不足也故以參耆甘草為君加麥

門者所以通心而清火桔梗載諸藥以益上焦之氣青皮利膈氣以制諸藥之壅所謂血生於氣

去勞散

治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時

有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不寧睡

多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成

羸劣之疾

白芍藥

六兩黃耆蜜炙

人參

去

白茯苓

半夏

湯炮七次

甘草

炙當歸去蘆酒洗

五味子

阿膠

炒

熟地黃

洗淨焙乾各三兩

右咬咀每服三錢生薑七片棗三枚水煎溫服日三

右以明每服三錢生薑七片黃連三錢水煎服服日三

滅法更然計

補肺湯

治勞嗽五臟虧損肺熱發熱盜汗自汗唾痰喘嗽

硃砂安神丸

人參

黃芪

紫苑

五味子

熟地黃

之意同宜思

桑白皮

炒各一錢

天腎液入心

右剉水煎入蜜少許食後服

為汗而汗者

補中丸

治婦人虛損諸疾

氣者衛氣也

白朮

熟地黃

白芍藥

川芎

衛氣者晝行

黃耆

人參

陳皮

陽則為氣為

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸溫水下

汗行陰則為

人參丸

養陰生血補虛

液為血若盜

人參

白朮

鹿角膠

當歸

芍藥

川芎

之氣反竄而

熟地黃

各等分

也此方用黃

固表防風為

之使歸地

方

黃引氣樂以
歸陰甘草從
中以和榮衛
故諸症愈矣

人身以氣血
為用五臟以
心腎為主心
腎者氣血之
父母此方以
三物補氣以
三物補血以
三物止嗽消
痰歟肺傷矣
然生夏性燥
損血用之何
居蓋氣以黃
芪為君血以
白芍為君而
又以熟地阿

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心米飲下

七補丸 治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經結狀若懷孕月候

尚來未分經脈宜服此方

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 白朮 白芷

阿膠炒各二分

右為細末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心米飲下

十補丸 治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸瘦面黃背倦口苦

舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱往來一切血崩帶下墮胎落孕

此藥皆治孕婦服之尤有神效

熟地黃淨洗酒浸蒸過 肉苁蓉酒浸 人參 黃耆去蘆

當歸酒浸 川芎 白芍藥洗 白茯苓 白朮去蘆炒

各二兩

膠潤燥五味
人參生津則
又何害于燥
然以之治微
敷有睡則可
若以之治紅
線則非今人
所敢及也幸
割酌之現用
人參黃芪尤
未敢輕用
有調嗽參
炭痰忌熟地
而此方既用
之非得知也
此即八珍意
而陳皮茯苓
之取亦當思
之

此亦八珍意
羊乳丸 治虛勞羸瘦

肉桂 去皮一兩 甘草 牛兩

右為細末用紅酒調山藥末打糊丸如桐子大每服六七十丸

食前米湯或溫酒下

滋陰百補丸 治婦人勞傷氣血諸虛百損五勞七傷陰陽不和

乍寒乍熱心腹疼痛不思飲食虛羸乏力

香附 一觔用酒醋鹽湯童便各浸四兩焙乾 益母草 半觔 當歸 酒洗六兩 川芎

熟地黃 薑汁 白朮 各四兩 白芍藥 炒三兩 玄胡索 炒 人參

白茯苓 各二兩 甘草 炙一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五六十丸砂仁湯或酒或醋

湯白滾水任下空心服

也以為丸故
去其以寒
故去茯苓而
鹿角膠之用
非以其為氣
血之屬而補
腎脈之勝體
乎八氣丸
四物同膠可
以補其脈之
虛白未止
可以謂衝脈
之氣以其經
結如孕經脈
未分故製方
如此七補丸
此即十全大
補湯加肉桂
淫藥也本草
以從藥為

黃耆炙 地黃酒浸 秦芫 山茱萸肉 柴胡 地骨皮等

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸煎人參湯下不拘時候

口進三服

六味丸一名地黃丸 名腎氣丸 治腎經不足發熱作渴小便淋瀝氣壅痰

嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰腿痠軟自汗盜

汗使血諸血失音水泛為痰血虛發熱等證其功不能盡述

熟地黃八兩 山茱萸肉 乾山藥各四兩 牡丹皮 白茯苓

澤瀉各三兩

右各另為末和地黃膏加煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空

心食前滾湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛弱飲食少思大便

司命能治男
子絕陽不興
婦人絕陰不
產故加之然
丸方用甘草
省其少而此
乃如方用之
又不以蜜丸
而以酒調山
藥為糊者欲
使丸無太緩
之能功有十
全之方也

八未
不實臍腹疼痛夜多漩溺等證即六味丸加肉桂附子各一

益陰腎氣丸 治諸臟虛損發熱肺熱潮熱盜汗或寒熱往來五

心煩熱或口乾作渴月經不調或筋骨痠倦飲食少思或頭目

不清痰氣上壅咳嗽肺虛胸膈痞悶或小便赤數兩足熱痛或

脚足痠軟肢體作痛等證此壯水之主以制陽光之劑

熟地黃八兩 山藥各四

白茯苓 牡丹皮 澤瀉各三 當歸

五味子炒各二兩 生地黃酒浸 各三

右為末入二膏加煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服五十丸空

心淡鹽湯下

烏雞丸 治婦人百病血氣虛勞赤白帶下等證

齊全綱目 卷四諸虛勞方

益母為君故
無傷于日草

而緩也百種丸

此方以黃芪

補上焦元氣

而配以地骨

之黃寒是補

氣不補火以

熟地清下焦

之水而配以

山茱之溫溫

是補水而又

生肝柴胡散

結熱之氣奈

其利一身之

机方以羊乳

名者以參芪

有羊肉之功

也羊乳丸

此方原名腎

黃耆

當歸各六兩

香附子四兩

白茯苓三兩

人參

官桂

熟地黃

生地黃

地骨皮各二兩

右為烏骨白鷄一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和煖麴丸

鷄頭實大喂鷄眼生眇弔死去腸肚及毛洗淨槌碎骨同前藥

並納鷄腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙乾並研為末用汁

打糊丸如桐子大每服五十丸鹽湯下

人參驚風丸治婦人一切虛損肌肉瘦瘠盜汗心忪咳嗽上氣

經脉不調或作寒熱不思飲食

人參

當歸

赤芍藥

杏仁湯浸去皮尖炒

甘草炙

桔梗去蘆

柴胡各一兩

地骨皮

宣黃連

胡黃連各一錢半

肉桂去粗皮

木香各半兩

麝香另研五分

鼈甲一枚重二兩者醋炙黃色

中有生氣也
賢為坎命門
同之命門之
氣宜藏而不
宜泄故口慳
噤以其愛五
臟六腑之精
而藏之也本
方以地黃滋
腎陰以山茱
山藥扶久薄
湯補四臟之
氣降而歸腎
而丹皮以瀉
陰中伏火火
去而氣生精
長所以四臟
皆有氣而生
生不旁也名

右為細末。用青蒿一觔。研爛絞汁。童子小便五升。酒五升。同熬至二升。次入真酥三兩。白砂蜜三兩。再熬成膏。冷方下。眾藥未搜和令勻。丸如桐子大。每服五十九。溫酒送下。無時。

艾煎丸。治婦人諸虛。

杜艾葉 太當歸各二兩 香附子四兩

右醋煮半日。焙乾為末。再用醋煮糊。丸。艾醋湯下。

薯蓣丸。補虛。

黃蓍四兩 鹽水浸火炙 北五味二兩

右為末。糯米糊丸。空心鹽酒下。

○治無熱虛勞

附子理中湯。治真陽不足。飲食難化。大便不實。腸鳴腹痛。飲食

畏寒手足逆冷

白朮

人參

乾薑炮

甘草炙

附子

炮去皮臍各等分

右剉每服四錢加生薑十片水煎服

黃耆建中湯治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大生氣血

補益榮衛

黃耆

錢三

白芍藥

炒四錢

肉桂

一錢半

甘草

炙二錢

右咬咀作一服加薑棗水煎食前服

加味黃耆湯治陽虛惡寒

黃耆

二錢

人參

白朮

甘草

炙各一錢

肉桂

五分

右剉水煎服○甚者加附子

十全大補湯治婦人冷勞最妙

曰腎氣豈無謂乎若八味者又溫生氣于陰之中以補火生土也故下元虛而腹痛旋溺者宜之六味九按腎氣丸立白仲景主作氣歸元故名之今加益陰二字乃添蛇足也豈立方之旨哉若五味猶能飲氣生津生地尚可涼血瀉火或少佐之庶幾近理而

失之矣或曰

歸味至可

賢燥殊

乃流行之

所以納

水而陰生

所謂水深土

厚也則氣

散而水溢所

方見經閉血枯條

渾身碎痛引毛 治婦人勞倦

虎骨 錢五

防風

莖木

白芷

茯苓

甘草 炙

白朮

當歸

芍藥 炒

續斷

附子 各一錢

右為籠未葺棗煎服不拘時

木香丸 治婦人冷勞經脈不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味

漸加羸瘦

木香

琥珀

吳茱萸 炮

當歸

牡丹皮

赤芍藥

三稜

附子 炮

延胡索

川芎 各七錢半

乾薑

人參

桂心 各半兩

北柴胡

白朮

鰾明

醋炙去

厚朴

熟地黃

陳橘皮 各一兩

齊全綱目

治婦人虛勞

十三

否乎

雞黃禽也鳥

骨白千金水

相生水無天

煨之義子婦

人所宜者用

水為用而陰

生陽長也但

此方所製諸

藥雖以氣血

為主然參茸

同官桂則溫

補太過苟非

血虛氣弱者

不可此方治

虛損者故用

參歸氣血

則津液枯而

肌肉瘦故用

酥蜜以潤之

右為未煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心溫酒下

戊巳丸 治新婚男子女人素稟虛寒滑泄飲食無味肌肉不生

多睡少寐終日昏蒙夜多異夢畏寒喜熱喫食嘔吐清小狀如

翻胃此藥養脾開胃滋血氣長肌肉添精益髓補煖丹田

茴香 白茯苓 香附子 胡椒 人參

甘草 白朮 硃砂 研細

右為細末生薑汁打糊丸如桐子大每服二三十丸空心食前

白湯下日三服

礪砂丸 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸瘦不食

驚風 桃仁 木香 五靈脂 當歸 各一

礪砂 二兩 醋一 升 熬成膏

自酥蜜同吞
仁甘桔又可
潤肺下氣而
除嗽也然氣
不足則寒而
心忪血不足
則熱而盜汗
故又于補氣
血之中一加
柴胡地骨黃
連以除熱
加肉桂木香
以溫寒赤芍
散血中之瘀
杏仁破氣中
之滯胡連密
甲青蒿童便
搜骨蒸之熱
而以射香為
引者是欲內

右為細末用硃砂膏為丸如桐子大空心溫酒下二十九此入硃砂
太多不宜輕用

○治有熱虛勞

逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤

口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹
痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛不和痰癭潮熱肢體羸
痺漸成骨蒸

當歸酒 白芍藥酒 白朮 白茯苓 柴胡各一

甘草炙五分一方用一錢半

右剉散水一盞半生薑三片麥門冬二十粒去心煎七分不拘
時服○一方用薄荷少許無門冬

外通而結熱散也又何不足之有此方調氣調經行血黃芩生艾煎丸可以此作補人方此補氣秘方也妙在川黃芪以鹽水浸煮用糯米以作糊丸以其能開胃也五味為佐惟虛而吸吸短氣者宜之香砂此方只在理中二字上体認仲景原作大九為煎和

熱甚加牡丹皮梔子炒

骨蒸加知母地骨皮

咳嗽加五味子紫苑

吐痰加半夏貝母瓜蒌仁

飲食不消加山楂神麴

發渴加麥門冬天花粉

胸中作熱加黃連梔子

心荒加遠志酸枣仁

吐血加阿膠生地黄牡丹皮

自汗加黃耆酸棗仁

久瀉加炒黑乾薑

道同服理山
妙處全在于
此今失其意
深可惜也如
大便不實者
遠宜遵之
理中者理氣
中之寒建中
者溫血中之
寒當歸建中
則溫榮以行
血黃芪建中
則溫衛以行
血日大建中
則氣血俱溫
俱行矣用者
須得此意
裏氣是則外
氣充外氣固
則內氣足此

遍身痛加羌活防風川芎以利關節

手足顫掉加防風荆芥薄荷

氣惱胸膈痞悶加枳實香附

怒氣傷肝眼目昏花加龍膽草黃連梔子

小腹痛加玄胡索香附子

經閉不通加桃仁紅花蘇木

左腹血塊加三稜蓬朮桃仁紅花

右腹氣塊加木香檳榔

黃耆散 治婦人勞熱羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參

黃芩

當歸

各七錢半

赤茯苓

赤芍藥

炒

生地黃

麥門冬

地骨皮

各一兩

柴胡

一兩半

方內外則長
而以肉往通
經脈于表裏
之間則陽虛
之寒釋矣其
加附子文兼
溫內也
主一身之經
絡清肝也而
肝所以藏血
以榮過口之
筋則一身之
碎痛當以肝
為主而生血
之本以脾為
十為脾統諸
經之血也防
風行肝氣干
過身自汗行
陽明于血海

甘草炙一錢半

右**吹明**每服四錢水一盞生薑五片煎六分去滓溫服無時

子芩散涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕

黃芪兩一人參 白芍藥 白茯苓 子芩

麥門冬去心生地黄各半兩苦梗二不

右為**雞米**先用竹葉一握小麥七十粒水三盞薑三片煎至一

盞半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

知母散治婦人勞熱體瘦壯熱四肢煩疼咽嗑不利少思飲食

柴胡 生地黄各一兩知母 黃芩 赤芍藥

麥門冬去心射干 升麻各七半甘草炙微赤

右為**鹿散**每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉二十七張

甘本益中十
以生血歸
柴肝于水過
身附子溫內
而通所不通
其本行上而
散至顛頂疾
外滲下而內
達九淵虎骨
猶斷其搜病
骨諸邪而定
病者歟其自
治勞倦者必
自因勞倦而
通身痛者也
此方補氣補
血破氣破血
溫氣行血通
氣養血非真

同煎至六分去滓不拘時溫服

半夏散 治婦人熱渴煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛或時寒熱

痰逆嘔吐不思飲食

黃芩

北柴胡

鱉甲

醋炙各一兩

大腹皮

七不半

半夏

知母

苦梗

人參

赤茯苓

秦艽

赤芍藥

麥門冬

烏梅肉

各半兩

甘草

炙二不半

右為龍末每服四錢生薑三片水煎溫服

秦艽散 治心經有熱血脉凝滯五心煩倦

秦艽

麥門冬

各一兩

當歸

生地黃

各半兩

地骨皮

鬱金

蘇木

各二不半

右為細末每服一錢水一盞紅花少許同煎至七分溫服若

冷勞氣帶血
寒而對者不
可投
此方全在破
血散結離白
治冷勞然實
為心腹積聚
日久以致瘦
瘁也大槩病
根于冷而至
于瘦故云然
若非真確豈
敢妄用
此治肝脾血
虛水鬱不達
而發熱者最
當引用門冬
所以除五心
之煩引用傅
荷滿肌膚之

經脉調不用紅花忌酒與熱物此方可服一年此方以生地麥
地骨除骨熱其味皆治血脉凝滯之物也少加紅花以見生
血之功專忌酒熱以免助熱之累然非真鬱金不能服一年也
然用地黃湯治熱勞手足煩心怔忡悸悶婦人血室有乾血身
體羸瘦不為肌肉

盤甲醋炙

熟地黃酒浸當歸

柴胡

白朮

茯苓

麥門冬去心石斛

秦艽各一兩

人參

肉桂不見火

甘草炙

右剉每服四錢生薑四片烏梅半個水煎溫服

胡黃連散

治婦人熱勞體瘦經脉不通四肢疼痛口乾煩渴不

得眠臥飲食全少

驚甲

一兩半醋炙黃去痞

天蓮益

酥炙黃

柴胡

生地黃

地骨皮

黃耆

大黃微炒

犀角屑兩

當歸

胡黃連

青蒿

右為錢末解服四錢以水一中盞入生薑一錢二分桃柳心各

之通川明

熱一開衣一

清裏其見不

同皆因病而

藥之也

加法俱平正

亦可法

較前方少四

味而赤芍又

不同前可以

得其補瀉之

意矣以竹葉

小麥為引者

重在心補之

意乎水散

此方較前黃

芪散無參芪

歸芪地骨而

加知母則于

升麻其重在

咽喉不利也

黃芩

各七錢半

赤芍藥

木香

麝香

細研各半兩

右為龕末每服四錢以水一中盞入生薑一錢三分桃柳心各

七莖煎至六分去滓不拘時溫服

犀角散 治婦人熱勞心胸煩熱不思飲食四肢多疼經脉澀滯

犀角屑

黃芩

甘草

炙各半兩

赤芍藥

虎杖

茯苓

地骨皮

麥門冬

去心

枳殼

微炒

當歸

各七錢半

柴胡

紅藍花

鱉甲

醋炙黃去裙各一兩

右為龕末每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

溫服無時

紅藍花散

治婦人熱勞四肢羸瘦經脉不通

柴胡

一兩

紅藍花

當歸

生地黄

赤芍藥

齊合開目

虛勞方

十七

然參芪有肺
熱還復肺之
戒故不用而
知母射干又
瀉火助火使
亦宜思之君
少思飲食從
咽喉不利來
則可用從脾
胃不足來則
不可輕用臨
症自考今
人以生夏大
腹之類性燥
為勞熱大忌
而古方乃以
生夏立名以
治熱勞豈非
誤哉且日治
煩渴口乾尤

治法類
卷四

鬼箭羽 虎杖 大腹皮 麥門冬去心 土瓜根

地骨皮 枳殼麩炒各一兩 甘草炙微赤半兩

右為龍散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

溫服無時

驚風散 治婦人熱勞發渴壯熱四肢煩疼漸漸黃瘦心胸躁悶

驚風醋炙黃 柴胡各一兩半 麥門冬去心 知母 川大黃炒

地骨皮 赤芍藥 黃耆 人參 黃芩

桑白皮各七錢半 甘草炙微赤半兩

右為龍散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白五寸豉五十粒煎至六分去滓溫服無時

呵膠丸 治勞嗽出血咯血發熱晡熱口渴盜汗

五味子 炒 雞蘇 各一 桐子 仁 炒 人參 防風

與也。如秦苑可治肢節之疼，半夏可治痰逆之嘔，驚用同柴胡以治寒熱，烏梅同麥以治口乾，若大腹皮者，又監制參芪之滯氣也。雖異何疑，轉而思之，又慙夫公之不苟者多矣。
此方以地黃當歸麥門以滋榮血脉，以四君石斛以清胃補脾，柴

阿膠炒 生地黃 卷柏葉 山藥炒 大薊根

五味子炒 雞蘇各一 栝子仁炒 人參 防風

麥門冬去心各半兩

右爲末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，細嚼，麥門冬煎湯下。

猪肚丸 治婦人熱勞羸瘦

地骨皮 木香各半兩 桃仁去皮尖 驚用各一兩半 黃耆各一兩 黃連三兩

右爲細末，用好猪肚一枚，淨洗，將藥末入猪肚內，以線縫合，蒸令爛熟，於磁器內研如膏，丸梧桐子大，食前粥飲下三十丸，食前再服。

○治骨蒸勞瘵

胡驚軍秦究

加味四物湯

治婦人骨蒸

熱亦八物湯

當歸

白芍藥炒川芎

生地黃

地骨皮

以肉桂為佐

牡丹皮

各等分

我其散信以

右咬咀

每服

錢水煎服

即以為法須

一方加白朮

此散前方大

黃連散

治婦人骨蒸勞熱四肢昏沉背膊疼痛面色痿黃漸漸

同小異而力

無力

量自是懸別

黃連

去鬚

知母

各一兩

蟹甲

醋炙二兩

柴胡

木通

各一兩半

赤芍虎杖上

麥門冬

去心

白朮

地骨皮

黃芩

犀角屑

各七錢半

瓜根皆破血

通經腹皮枳

龍膽草

去蘆

甘草

炙微赤各半兩

黃芩

犀角屑

各七錢半

其他不過清

心涼血鮮熱

右為散

每服四錢

以水一斗

煮生薑一錢

淡竹葉二七片煎

按此以方大
同小異而柴
功亦均地骨
醫則當用
而參芪大黃
似發大腹之
煩明瓦有去
取斷輪者月
有運斤之妙
臨症之際宜
審議
此方以四物
生四臟之陰
以連骨壯丹
解骨蒸之熱
其加白朮者
以土為萬物
之母也大意
如此
夫腎之修氣

至六分去澤溫服無時

青蒿散 治婦人骨蒸勞熱四肢煩疼日漸羸熱

青蒿 醋炙各二兩 柴胡半兩 黃連黃芩

桑白皮 白朮各兩 桐子仁 知母各七錢半 地骨皮

甘草 炙各半兩 龍膽草二錢半

右為散散每服四錢以水一中盞人生薑一錢三分煎至六分

去澤溫服

柴胡散 治婦人骨蒸勞熱欬嗽胸膈痰壅腹脇妨悶不欲飲食

柴胡 桑白皮 麥門冬去心 赤茯苓各一兩 川大黃剉碎微炒

枳殼去穢炒 百合 秦艽 紫苑洗 黃芩 赤芍藥

知母 水通各七錢半 夏通去滑 甘草炙各半兩 薑半兩 醋炙

結而成骨心
火土燥久則

為虛方以

黃連水通

角來口是心

熱乾

清骨

救腎

胆瀉心知母

白木甘草

諸藥而保脾

如是則壯火

水日旺而骨

蒸去矣又何

勞執之有

前方有不通

犀參此方有

武陽路此

又用也然知

母所以

以

右為散每服三錢以水一中盞入生薑一錢三升煎至六分

去滓溫服無時

河車丸 治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等疾

紫河車 一枚初生男胎者尤長流水中蕩洗
血淨入磁器內重湯煮極爛汁入藥 揀去一

白茯苓 二兩
雪白者 乾山藥 二兩

右為細末入河車汁加麵糊為丸如桐子大力少麝香末為衣
每服三五十丸米飲溫酒鹽湯任下空心服嗽甚者五味子湯

下

黃耆丸 治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心躁不得眠臥

黃耆 麥門冬 心茯苓 北柴胡 生地黄

甘草 酸棗仁 炒 郁李仁 枸杞子 杏仁 去皮尖 炒黃

知母 秦艽 升麻 年 假 補 甲 子 亥 二

清火之熱
余地知母所
以傷肺金之
熟柴胡驚甲
青蒿解骨蒸
勞熱然肺渴
則氣傷于土
火去則土無
以生故用黃
芪白朮甘草
有所以發巨
陽之藥以保
赤子于干戈
之地也
此方重在咳
嗽痰壅腹脇
妨悶上故用
大黃半夏然
大黃牛黃為
今人所宜登

人參去蘆

黃芩各七錢半 百合

穀去糠 赤芍藥

知母

秦艽

各半兩 驚甲製二兩

右為細末煉蜜丸桐子大清粥吞下三十丸無時

地黃煎丸解勞生肌進食活血養心

生地黄汁

杏仁汁

生薑汁

藕汁

各五升

薄荷汁

驚梨汁

各一升 法酒

炒蜜

四升

右共合一處慢火熬成膏入後藥

北柴胡三兩 木香

人參

茯苓

栢子仁

去皮大所

山藥

遠志肉

枳實炒

白朮

各一

秦艽

苦梗

各二兩

麝香

半兩

熟地黃

洗焙酒蒸四兩

右為細末以前膏和丸如桐子大食後甘草湯下二三十丸

古人之不如
今人歟善用

者當自得之
嗟乎閨中人

之方茂於今
人之病歟有

慨哉
此方佳氣益

清養血安眠

腸胃不和
才食仁雖能

潤燥然大使
滑者不宜

按骨蒸勞
未有不用柴

胡蓄節者而
此方以諸汗

熬膏以潤肺
除逆消痰為

○治傳尸勞

天靈蓋散 治婦人傳尸骨蒸勞 四肢無力 每至晚間即熱兩頰

紅色 飲食不下 心神煩躁

天靈蓋 酥炙 香 地骨皮 當歸 人參 去蘆

山梔子仁 貝母 去心 黃連 桃仁 去皮尖 炒黃 榔 各一兩

生乾地黄 驚風 醋炙 北柴胡 赤茯苓 蒸門冬 各一錢半

阿魏 半兩

石為籠未 每服四錢 以童子小便一大盞 桃柳枝各七寸 生薑

五片 葱白五寸 煎至七分 去滓溫服

益母草丸 治婦人骨蒸勞瘦 月候不通 心神煩熱 四肢疼痛 不

能飲食

正不恐滿眼
治脾故又佐
以參朮山藥
茯苓射香之
類以疎啟中
氣而相子遠
志又所以養
脾之母而潤
心也如肌膚
滑瀉而氣面
虛者請苦
試之何如
傳尸者見崇
淹纏彼此傳
染相續而亡
其症亦大相
類然以為傳
尸有虫形變
不一大槩亦
是宿冤所伏

益母草 青蒿各一斤 桃枝 柳枝各一握

已上四味剉細用童子小便一斗於銀鍋內煎至三升絞去滓

煎成膏

柴胡 赤芍藥 犀角各一斤 鱉甲製二兩 桃仁製爭五兩

天靈蓋酥炙 硃砂細研水飛過 水香 甘草各二兩 麝香半兩

右為末用前膏和搗五七百杵丸如桐子大每服三十九煎烏

梅甘草湯下無時

獼肝丸 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食

獼肝具一 鱉甲醋炙 北柴胡各一斤 川升麻 桃仁製

天靈蓋酥炙 犀角斤 梔子仁 地骨皮 知母各一兩

黃耆七錢 甘草半兩 麝香半兩 硃砂一兩 細研水飛

皆合調目 卷四 骨蒸勞熱方 三七

故多難治此方以天靈蓋祛伏尸安息香逐和崇阿魏檳榔桃仁祛山後見其餘諸藥則補氣血清血消痰而別無所奇而其妙則在薑使桃柳枝葱姜而已

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫水下無時殺鬼方治婦人骨蒸傳尸勞瘵鬼氣伏連

麝香七錢犀角屑木香白朮鬼箭羽各一兩

虎頭骨酥炙天靈蓋醋炙雄黃另研桃仁去皮大

硃砂光明者另研

右爲細末入研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服二十丸溫水下此藥辟溫疫亦可帶

○治血風勞

人參荆芥散治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目澁心忪煩倦

寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽

人參荆芥穗左地黃北柴胡鱉甲醋炙

病至於此生
者少矣何復
取一死人枕
以結來生業
寬也
血風勞者若
血虛肝熱生
本而或勞者
考內熱勞症
其有外邪來
者又為外鉅
之病當兩分
治
此方以十全
大補去黃芪
白芍而加荆
芥防風蓋荆
芥力行散肝
中結血即六

酸棗仁

枳殼製

羚羊角別

白朮

各錢半當歸

川芎

防風

桂心

甘草

各半兩

右為龍未每服五錢生薑三片水煎熱服

地骨皮散治婦人血風氣體虛弱寒熱發渴

地骨皮

桑白皮

枳殼

前胡

黃耆

各一錢半

人參

白茯苓

白芍藥

五加皮

各一錢

柴胡二錢

官桂

甘草

各半錢

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾不拘時服

大效油煎散治血風勞氣攻注四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思

飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷敗神效

五加皮

川烏炮

芍藥

梅桐皮

牡丹皮

各一兩

鬱發之義

而桂心之用

乃古方之常

當自斟酌

前方其治心

此方兼治肺

而官其之用

意非氣熱所

宜上血風一

字不知將何

以解

此方以川烏

姜桂等藥為

主是真治血

中有風也故

其出症有風

之風冷攻注

等症其煎

法以生麻油

為發其入

川芎

桂心

乾薑

各半兩

右為細末每服二錢水一盞生麻油浸錢一文同煎至六分溫

服常服以油浸二錢煎藥時不可攪吃藥時不可吹

治血風勞力

荆芥穗

白芍藥

牡丹皮

防風

地骨皮

白芷

黑豆

甘草

各一兩

川芎

二錢半

右為細末每服二錢水一中盞姜三片棗一個葱白一寸煎至

八分溫服無時

萬全逍遙散治血風勞五心煩躁心多怔忡恍惚憂懼頭目昏

重夜多盜汗

人參

黃耆

白朮

白茯苓

去皮

柴胡

各半兩

乾地黃

治婦人血風勞冷氣攻心心腹疼痛四肢不和似

肝潤燥。按肝
謂前據可度
吃不可吹。又
不知其深意
也。
此又治在風
熱清而血自
肝也可為良
洗第恐人不
自悟耳。
既治血風何
為盡用氣藥
況以氣藥而
欲治以下諸
症似亦不能
愚謂此方用
治血風勞乃
治氣虛症也
用者審之
既治冷氣富

布為散。每服三錢。人甘草一寸。同煎溫服。

熟乾地黃散。治婦人血風勞。冷氣攻心。心腹疼痛。四肢不和。欲

食減少。口漸羸瘦。

熟乾地黃 柴胡 黃耆 薤白 牛膝各一兩

鱉甲醋炙黃二兩 白芍藥 當歸 薑黃 琥珀

厚朴薑汁塗炙 川芎 陳皮去白各七錢半 木香 羌活

桂心各半兩

右為散。每服四錢。加生薑半分。水煎熟服。

同前方入無
熱虛各條內
然以風名而
有風藥以冷
名而有熱藥
以勞名而有
治勞藥以血
藥補血散血
以氣藥補氣
行氣用平胃
以和脾胃而
除心腹之疼
用薤白以通
經而除四肢
之病益以錯
雜之邪而用
錯雜之藥今
之所謂良醫
概如此

濟陰綱目卷之四終

癰陰綱目卷之五

吳興 金德生問風父軒者 錢塘 查學淳用拙父訂正

西陵 汪 洪惟翰之箋釋 天都 查 望于周父泰園

○積聚癰瘕

○論婦人諸積形狀

準繩云。大全良方分瘕。瘕諸氣疝瘕。八瘕腹中瘕。血瘕。痞食瘕。血

瘕。凡七門。瘕者在腹內。近臍左右。各有一條筋脈急痛。大者如臂。

次者如指。因氣而成。如弦之狀。故名曰瘕。瘕者。僻在兩肋之間。有

時而痛。故名曰瘕。瘕者。痛也。瘕者。假也。其結聚浮假而痛。推移乃

動也。八瘕者。黃瘕。青瘕。燥瘕。血瘕。脂瘕。狐瘕。蛇瘕。蠃瘕。積在腹內。

或腸胃之間。與臟氣結搏。堅牢雖推之不移。名曰瘕。言其病形可

外有腸覃石
瘕病瘕三症
亦當與此條
參看
按七門之中
而瘕有八其
瘕或聚或
散瘕瘕之類
痛俱見之痛
則隨其可與
瘕並稱則八
瘕之外又有
三積矣又男

子為七疝。女為癥。則經血。癥亦可同經。男與女亦有同病。是疝。不止于八也。疝。口食。而血。及痰飲何也。益病氣之中。未嘗無飲。而血痰食藏之。以未嘗無痰。則痰食而又不有。不先因。氣而形病也。故消積之中。當兼行氣消。痰疝瘕之藥。為是。

微驗也。氣壅塞為瘕。言其氣痞塞不宜暢也。傷食成塊。堅而不移。名曰食瘕。血成塊。堅而不移。名曰血瘕。若夫腹中瘕血。則積而未堅。未至於成塊者也。大抵以推之不動為瘕。推之動為瘕也。至夫疝與瘕。瘕則與痛俱。痛即現。不痛即隱。在臍左右為瘕。在兩肋之間為瘕。在小腹而牽引腰脇為瘕。恐學者一時難了。未免淆亂。故總叙而條析之。

論婦人八瘕所因

病源曰。八瘕者。皆胞胎生產月水往來。血脈精氣不調之所生也。腎為陰主開閉。左為胞門。右為子戶。主定月水生子之道。胞門子戶。主子精神氣所出入。合於中黃門。玉門四邊主持開元。禁閉子精。臍下二寸。名曰關元。主臟魄。婦人之胞。三焦之府。常所從止。

未通。氣便得。往來入合於。若生血未盡而合。

然婦人經脈俞絡合調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣便得往來入合於臟若生血未盡而合陰陽即使婦人血脈壅急小腹重身支滿胸脇腰背相引四肢痠痛飲食不調結生惡血不除月水不順或月前月後因生積聚如懷胎狀邪氣甚盛者令人恍惚多夢寒熱四肢不欲動陰中生氣腫内生風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月久即不復生子也

黃瘕者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟六腑虛靡精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名爲陰虛則生黃瘕黃瘕之聚令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得按若

腰背相引痛。月水不利。令人不產。小腹急下。引陰中如刺。不得小便。或時寒熱。下赤黃汁。令人無子。當刺關元。氣衡行。以毒藥。瘕下即愈。

青瘕者。婦人新產未滿十日。起行以洗。洗太早。陰陽虛。玉門四邊皆解散。子戶未安。骨肉皆痛。手臂不舉。飲食未復。內臟吸吸。又當風臥。不自隱蔽。若居濕席。令人苦寒。洒洒入腹。煩悶沉淖。惡血不除。結熱不得散。則生青瘕。聚在左右脇下。藏於背脊上。與肩脾腰下。攣急。腹下有氣起。嚕嚕。不可多食。四肢不欲動搖。手足腫。面目黃。大小便難。其後月水爲之不通利。或不復禁。狀如崩中。此自過所致。令人少子。療之當刺胃管。行以毒藥。有法。瘕當下即愈。瘕者。婦人月水下。惡血未盡。其人虛憊。而以夏月熱行疾步。若

舉重移輕汗出交流氣血未平而卒以悲怒致腹中狼咽不洩經脈鬱急內結不舒煩懣少力氣上達胸膈背脊少腹壅急月水與氣俱不通利而反以飲清快心月水橫流溢入他臟不去有熱則生燥瘕之聚大如半杯上下腹中苦痛連兩脇下上引心而煩害飲食欲嘔吐胸及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足痠前久立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便澁難病如此者其人少子療之以長鍼按而刺之法度行以毒藥瘕當下即愈血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣盛溢入他臟若大饑寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下未定左右走腸胃之間留絡不去內有寒熱與月水合會爲血瘕之聚令腰痛不可俛仰橫骨下有積氣牢如石小腹裏急若痛若瘕疼深

達腰腹下。變陰裏若生風。冷子門。僻月水不時來。乍來乍不來。此病令人無子。療之。痕當下即愈。

脂痕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。以合陰陽絡脈分胞門。傷子戶。失禁。關節散五臟六腑津液流行。陰道調動。百脈關樞四解。外不見其形。子精與血氣相遇。犯禁。子精化不足成子。則爲脂痕之聚。令人支滿裏急。痺引少腹重。腰背如刺狀。四肢不舉。飲食不甘。臥不安席。左右走腹中切痛。時瘥時甚。或時少氣頭眩。身體解。仿苦寒惡風。膀胱脹。月水乍來乍去。不如當度。大小便血不止。如此者。令人無子。療之。當刺以長鍼。行以毒藥。痕當下即愈。

狐痕者。婦人月水當日數來。而反悲哀憂恐。若似遠行逢暴風疾。兩雷電驚。衣被泥濕。罷倦少氣。心中恍惚未定。四肢懈惰。陰穴

子。婦人月水不調。不通。少腹脹。痛。陰中。小。便。難。通。

苦寤寐氣絕精神游亡邪氣入於陰裏不去則生狐瘕之聚食人
子臟令人月水閉不通少腹痞滿胸脇腰背痛陰中腫小便難胞
門子戶不受男精不藏氣盛令人嗜食欲嘔噦唾多所思如有身
狀四肢不舉本此病者終身無子其瘕有手足成形者殺人未成
者可療以長鍼急持刺之行以毒藥有法瘕當下即愈
蛇瘕者婦人月水已下新至適閉未復胞門子戶勞傷陰陽未平
榮衛分行若其中風暴病羸劣飲食未調若起行當風及涉泥塗
因衝寒太早若坐濕地名陰陽亂腹中虛若遠行道路飲汚井之
水食不潔之食吞蛇鼠之精留絡不去因生蛇瘕之聚上食心肝
長大其形如棗在臍上下還旁左右脇不得吐氣兩股脛間苦疼
少腹多熱小便赤黃膀胱引陰中攣急腰背俱痛難以動作喜發

寒熱月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者。殺人。未成者可治療之。有法。行以毒藥。瘕當下即愈。

鼈瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。蹠立未安。顏色未平。復見所好。心爲之開。魂魄感動。五內脫消。若入水浣洗沐浴。不以時出。而神不守。水精與邪氣俱入。至三焦之中。幕玉門先閉。津液妄行。留絡不去。因生鼈瘕之聚。大如小杵。令人小腹內切痛。惡氣左右走上。下腹中苦痛。若存若亡。持之躍手。下引陰裏。腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘕有手足成形者。殺人。未成者可治療之。有法。行以毒藥。瘕當下即愈。

大全云。婦人瘕病由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏。積於腹中。牢

論婦人癥瘕

大全云婦人癥瘕由飲食失節脾胃虧損邪正相搏積於腹中牢
固不動有可徵驗故名曰癥氣道壅塞故名曰瘕得冷則發冷入
子臟則不孕入胞絡則月水不通

薛氏曰前證若脾胃虛弱用六君子加芎歸若肝脾虛弱用補中
益氣及歸脾湯若肝火鬱滯佐以蘆薈丸六味丸外貼阿魏膏思
者須慎七情六淫飲食起居泊者不時審察病機而藥之庶幾有
效

論食癥

大全云婦人食癥臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾胃既虛不
能消化與臟氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不移故謂之食癥

也

薛氏曰前證若形氣弱須先調補脾胃為主而佐以消導若形氣見實當先疏導為主而佐以補脾胃若氣滯血滯而不行者宜用

烏藥散

散用烏藥我萊醋浸炒桂心當歸桃仁青皮木香各等分爲末每二錢熱酒送下

脾氣虛而血不行者宜用四君芎歸補而行之若脾氣鬱血不行者宜用歸脾湯解而行之若肝脾血燥而不行者宜用加味消遙散結而行之大抵食積痞塊之證爲有形蓋邪氣勝則實真氣奪則虛當養正闢邪而積自除矣雖然堅者削之客者除之胃氣未虛或可宜用若病久虛弱者不可輕試也

○論血癥

大全云婦人寒熱失節臟腑氣虛風冷在內飲食不消血氣相

病舉發血不除結聚所生久而不癒則心腹兩脇痛者皆血氣相

有以左畔為
血癥者片肝
之謂焉為
血病

結漸生。顛。壅。盤。牢。不。移。動。者。是。也。皆。因。血。氣。勞。傷。月。水。往。來。經。絡。
痞。塞。惡。血。不。除。結。聚。所。生。久。而。不。瘳。則。心。腹。兩。脇。苦。痛。害。於。飲。食。
肌。膚。羸。瘦。

問。癥。一。也。何。以。知。是。血。癥。曰。血。外。之。証。脅。悶。煩。燥。迷。忘。驚。狂。痰。嘔。
汗。多。骨。熱。肢。冷。其。畜。在。下。焦。者。必。臍。下。結。急。外。熱。內。痛。尺。脈。洪。而。
數。也。桃。仁。靈。脂。生。地。黃。牛。膝。大。黃。甘。草。祛。逐。之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損。五臟氣血乖違。而致。蓋氣主噓之。血
主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。悲怒傷肝者。多患之。腹脇作
痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣為
主。治法當主於固元氣。而佐以攻伐之劑。必需之歲月。若期速效。
投以峻劑。反致有悞。

論腹中瘀血

大全云。婦人月經否塞不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。爲風冷所乘。血得冷則成瘀血也。血瘀在內。則時時體熱面黃。瘀久不消。則爲積聚癥瘕矣。

薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用加味歸脾湯。若恚怒傷肝。用加味逍遙散。若產後惡露用失笑散。若肝脾虛損。用六君子。柴胡以補元氣爲主。胃氣虛弱。用補中益氣湯。加茯苓。生夏爲主。大凡腹中作痛。畏手按者。此內有瘀血。若形體如常。屬病氣。元氣俱實。用桃仁承氣湯直下之。若痛而肢體倦怠。飲食少思。此脾胃受傷。屬病氣有餘。元氣不足。用當歸散調和之。若痛而喜手按腹。形體倦怠。飲食少思。此形氣病氣俱不足。用六君子。炮薑。歸純補之。若痛而大

胃故其言如此然亦一偏之見復攻之藥不得其竅反致傷氣以致不救故不如善守之為愈矣

使不實飲食難化此脾腎虛寒用六君炮薑肉果溫香之若痛而作嘔少食此脾胃虛弱用六君炮薑丁香若痛而嘔吐不食泄瀉用六君薑桂若兼手足逆冷白痢更加附子此証多有因攻伐而致者

○論痞癖

大全云痞者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰痞也癖者為僻側在兩肋之間有時而痛故曰癖也二者皆陰陽不和經絡痞隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發作疼痛夫痞癖癥瘕血氣塊硬發作則痛甚則欲死先而言之皆血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍甚而死一二日方省醫巫併治數年不愈僕

以葱白散烏雞丸遂安。又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛。要一人扶定方少止。亦用此二藥而愈。尋常小小血氣用此二藥亦有奇效。故錄於後。

論疝瘕

大全云。婦人疝瘕。飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風冷入腹。與血相結。所生疝者。痛也。瘕者。假也。結聚浮假而痛。推移乃動也。婦人之病。有異於丈夫者。或因產後血虛受寒。或因經水往來取冷過度。非獨因飲食失節。多挾瘀血。氣所成也。其脈弦急者。生虛弱小者。死。尺脈澀而浮。牢。為血實氣虛。其發腹痛。逆氣上行。此為胞中有惡血。久則結成血瘕也。

薛氏曰。子和云。遺溺閉癢。陰痿浮痺。精滑白濁。皆男子之疝也。若

女子之疝也。但女子不謂之疝。而謂之瘕。

女子亦有
男子亦有

血涸月事不行。行後小腹有塊。或時動移。前陰突出。後陰痔核。皆女子之疝也。但女子不謂之疝。而謂之瘕。

一婦人小腹痞脹。小便時下白帶。小水淋瀝。此肝經濕熱下注。用龍膽瀉肝湯而愈。

一婦人小腹脹痛。小水不利。或胸乳作痛。或脇肋作脹。或氣逆心嘔。余以爲肝火而血傷脾。用四物柴胡。青皮玄胡。索木香而愈。

一婦人小腹痞悶。小便不利。內熱體倦。懶食。用八珍湯加柴胡。山梔。龍膽草治之而安。

論腸覃

李氏曰。腸覃乃寒氣客於大腸。與胃相搏。大腸爲肺傳送。肺主氣。氣得熱則行。得冷則凝。凝則清氣散而濁氣結。爲瘕覃。延日久不

癥瘕積聚並

起于氣故有

氣病氣聚之

說然諸病

血病氣聚

而後血凝也

其夾食夾痰

又各隨所積

而變其矣夫

痰與血食皆

耗氣以為之

行化故氣行

物生氣病物

此百病所

以生于氣

而後血凝痰

已。癥。肉。乃。生。始。如。雞。卵。久。如。懷。胎。按。之。堅。推。之。移。月。事。時。下。或。多。或。少。氣。病。而。血。未。病。也。宜。二。陳。湯。加。香。附。以。開。之。或。香。粉。丸。

○論婦人癥瘕並屬血病

準繩云古方有五積六聚七癥八瘕之名五臟之氣積名曰積故

積有五六府之氣聚名曰聚故聚有六雜病準繩言之詳矣若夫

七癥八瘕則婦人居多七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬

肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不混夫癥者堅也堅則難破瘕者

假也假物成形古人將婦人病為癥疾以蛟龍等為生瘕然亦不

必如此執泥婦人癥瘕並屬血病龍蛇魚鼈肉髮蟲瘕等事皆出

偶然但飲食間誤中之留聚腹臍假血而成自有活性亦猶水微

中僧病噎若腹中有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結

用氣藥者
收梳收梳
川益取義耳
未必盡善

爲病現雖內所感之不同治法當以類相從所謂醫者意也如以
敗梳治齒痛銅屑治龍瘡麝香治米瘰石灰治酒瘰如此等類學
者可以理解也

論治積須養正氣

薛新甫云婦人瘰癧瘰癧大抵因飲食起居七情失宜虧損臟腑
氣血乖違陰絡受傷循行失度所致

羅謙甫云養正積自除必先調養使榮衛充實若不消散方可議
但除之不以漸則必有顛覆之害若不守禁忌縱情嗜慾其有
不喪者鮮矣

非鬱結之脈
而謂鬱之症
何欤
神中蓋氣

一婦人內熱作渴飲食少思腹內初加雞卵漸大四寸許經水三
月一至肢體消瘦商煩似著脉洪數而虛左關尤甚此肝脾鬱結

以能治鬱結
意取營氣外
散也

虛者丸治肝
陰之結

經脈經

卷五

十

之証外貼阿魏膏。午前用補中益氣湯。午後用加味歸脾湯。兩月
許。肝火稍退。脾土少健。午前補中益氣。下六味丸。午後逍遙散。下
歸脾丸。又月信。日用歸脾丸二服。空心以逍遙散下。日晡以歸脾
湯下。喜其謹疾。調理年餘而愈。

一婦人腹內一塊。不時上攻。或作痛有聲。或吞酸痞悶。月經不調。
小便不利。二年餘矣。面色青黃。余以為肝脾氣滯。以六君加芎歸。
柴胡炒連木香吳茱各少許二劑。却與歸脾湯送下。蘆薈丸三月。
餘。肝脾和而諸証退。又與調中益氣湯加茯苓牡丹皮。中氣健而
經自調。

一婦人性多鬱。善怒。勤於女工。小腹內結一塊。或作痛或痞悶。月
經不調。多服伐肝之劑。內熱寒熱。胸膈不利。飲食不甘。形體日瘦。

牙齦腫爛。此脾土不能生肺金。肺金不能生腎水。腎水不能生肝木。當滋化源。用補中益氣湯六味丸。至仲春而愈。

一婦人經候過期。發熱倦怠。或用四物黃連之類。及兩月一度。且少而成塊。又用暖藥通之。兩目如翳所蔽。余曰。昂為諸陰之首。目為血脈之宗。此脾傷五臟皆為失所。不能歸於目也。遂用補中益氣。濟生歸脾二湯。專主脾胃。年餘而愈。

松江太守何恭人。性善怒。腹結一塊。年餘上齧蝕透。血氣虛極。時季冬肝脈洪數。按之弦緊。或用伐肝木清胃火之藥。余曰。真氣虛而邪氣實也。恐伐肝木。至春不能發生耳。用八珍湯以生氣血。用地黃丸以滋腎水。肝脈頓退。因大怒。耳內出血。肝脈仍大。煩熱作渴。此無根之火也。仍以前藥加肉桂二劑。脈微熱退。復因大怒。果

此觀於後背
以肝脾腎為
主而愈者
在
他處則不可

至論

卒於季冬辛巳日乃金尅木故也

李氏曰善治癥瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其大半而止不可猛攻峻施以傷元氣寧扶脾胃正氣待其自化此開鬱正元散之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻擊之藥病重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

○論癥積用吐下

子和云戴人過難遇一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦爲室女時心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如冰娶來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用我藥病可除孕可得卒從之戴人診其脉沉而遲尺脉洪大而有九非無子

知脉病相同
故病可除子
可得

心下平軟次服白朮湯中陽五苓散服後以四物湯和之下再月風

魚腥與能
用法痛快

之候也。可不踰年而孕。其良人笑曰。試之。先以三聖散吐涎一斗。
心下平軟。次服白朮調中湯。五苓散。後以四物湯和之。下再月。氣
血合度。數月而銀三子。戴人嘗曰。用吾此法。無不子之婦。此言不
誣。三聖散。用防風。瓜蒂。各三兩。蘆薈。一兩。為粗末。以漿水煎服。製
法詳見諸門事。白朮調中湯。用白朮。茯苓。澤瀉。橘紅。各
半兩。甘草。一兩。乾薑。官桂。砂仁。藿香。各
二錢。牛。為末。白湯化蜜調服。二錢。無時。

陽夏張主簿之妻。病肥氣。初如酒杯。大發寒熱。十五餘年後。因性
急。悲感。病益甚。惟心下三指許。無病。滿腹如石片。不能坐臥。針灸
師矣。徒勞人耳。乃邀戴人診之。曰。此肥氣也。得之季夏戊巳。在
左脇下。如覆杯。久不瘳。令人發癰瘡。瓜蒂散吐之。魚腥黃涎約一
二升。至夜。絕用舟車丸通經散投之。五更黃涎膿水相半五六行。
凡有積處。皆覺痛。後用白朮散。當歸散。和血流經之藥。如斯瀉泄。

宜熱調

按此諸藥方
治氣血痰食
平穩之劑海
粉不忌煎若
作片更佳

丹三次療

小帶散丹車丸方見雜病傷食痰飲二門。通經散用
過去麩餅乾三味各等分爲細末每服三錢臨臥溫淡酒謝下。
白朮散白朮黃芩當歸各等分爲末每服二三錢水煎食前服。
當歸散當歸杜蒺藜等分爲末米飲調服食前。
此吐下兼施且甘遂等逐水太峻用者審之。

脈法

脈經曰婦人病瘕積聚脈弦急者生虛弱者死。少陰脈浮而緊
緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產。

通治諸積

開鬱正元散

治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚腹痛且此

利氣行血和脾消滯

白朮

陳皮

青皮

香附

山楂

海粉

桔梗

茯苓

砂仁

玄胡索

神麴

炒

麥芽

甘草

炙各等分

大七氣湯

治積聚瘕瘕隨氣上下心腹痞痛上氣望裏小腹脹

此惟病氣形
氣俱重者可
用此重在下
氣鬱生火者
忌之

此方劑堅積
破滯氣即用
白水為佐而
氣虛者不可
輕服

右劉每服一兩生薑三片水煎服

大七氣湯 治積聚癥瘕隨氣上下心腹痞痛上氣壅塞小腹脹

滿大小便不利

京三稜 蓬朮各煨 青皮去白 陳皮去白 香附炒

藿香葉 益智仁 桔梗 肉桂不見火 甘草炙七錢半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

助氣丸 治三焦痞閉胸膈滿悶氣不流通蘊結成積痞癖氣塊

並皆治之

京三稜 蓬朮已土二味各用油細包灰火中煨透切片各二斤 青皮去白

陳皮去白 白朮各十兩 枳殼麸炒去穢 檳榔 木香各十兩

右為末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

此方治積聚用吐下

若寒氣鬱者
可用

用藥巧處

土在氣行血
流痰消食消
也妙在用醋
之多

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積

女人脾血積小兒食積

京三稜

莪菜二味同醋煮

青皮

陳皮

乾薑炮

五莖炒各兩

香附子酒炒三兩

右為末醋糊丸如桐子大每服三十丸生薑湯下○虛者以補

藥下之○一方加神曲麥芽

三稜煎 治婦人血瘕血癥食積痰滯

三稜

莪菜

各一兩 青皮去白

半夏

湯炮七次

麥芽

炒各二兩

右用好醋六升煮乾為末醋糊丸如桐子大每服五十丸淡醋

湯下○痰壅薑湯下

香稜丸 治一切積聚破痰癖消癥塊

此溫行之法
峻而不猛行
而得妙在
用醋

九消塊俱用
枳藥行氣消
堅之劑而此
方又以補中
帶消真千金
方也用者式
之

木香

丁香各半

枳殼炒

三稜

酒浸

莪茂

細切每一

三十粒去殼同炒待已
豆黃色去巴豆不用

青皮製

川楝子肉

藳香炒各

右為末醋煮麴糊丸如桐子大朱砂為衣每服三十丸薑鹽湯

或溫酒下無時

大硝石丸 治七癥八瘕聚結痞塊及婦人帶下絕產腹中有瘕

瘕者常先下此藥但去瘕瘕令人不困

硝石三兩

大黃四兩

人參

甘草

各一兩

右為末以三年苦酒三升置銅石器中先用大黃微火熬微沸

常攪不息至七分內餘藥復熬成膏至可丸即丸如桐子大每

服三十丸米飲下三日一服婦人服之或下如雞肝或如米汁

赤黑等物二三升後忌風冷

阿魏膏 治一切瘡塊

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲 生地黃

兩頭尖 大黃 白芷 天麻 各五錢 紅花 四錢 木鼈子 十粒

去殼 槐柳桃枝 各三錢 亂髮 雞子大一團

右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮煎髮化仍去渣徐去黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處鋪平半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

○分治八瘕

八瘕之由皆 皂莢散 瘰癧導方

皂莢 一兩炙去皮子 蜀椒 一兩去汗 細辛 一兩

白胞門子戶

方以導之

右搗散以三角囊大如指長二寸貯之內陰中欲便悶則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

療青瘕坐蓐

戎鹽一光同 皂莢半兩去皮子炙 細辛一兩

右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但臥瘕當不消如葵汁養之如產法

療燥瘕方

大黃如雞子許 乾薑各三兩 黃連三兩 桂心一兩 厚朴四兩炙

柳李仁一兩去皮尖炒 廬蟲三枚炒 雞臙脰中黃膜一枚炙

右搗散早朝空腹以溫酒一盞和三錢頓服瘕當下畢養之如產法三月勿合陰陽無子者當

香脂即油脂

療血瘕攻刺腹脇時痛藥方

大黃

當歸各半兩

山茱萸

皂莢

去皮法各一兩

細辛

戎鹽

各二錢半

右搗以香脂丸如指大每用一丸綿裹內陰中正坐良久瘕當白下養如乳婦法

療婦人血瘕痛方

乾薑

烏鰂魚骨

炙各一兩

桃仁

一兩去皮尖

右搗散酒服三方寸七日二方無桃仁

桃仁煎治婦人血瘕血積經候不通

桃仁

大黃

各一兩

燕蟲

半兩炒黑

朴硝

另研二兩

右為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃蟲桃仁不住手攪煎至可丸下朴硝攪勻出之丸如梧桐子

赤豆泔或如雞肝蝦蟇之狀末下再煎如鮮血來即止續以

可怪

療脂瘕方

太前一日不用喫晚飯五更初用溫酒吞下五丸日午取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣之狀未下再服如鮮血來即止續以調補氣血藥補之○本事方云頃年在趾陵有一貴家妻患小便不通臍腹脹不可忍眾醫皆作淋治以八正散之劑愈甚予診之曰此血瘕也非眩暈藥不可去用此藥更初服至日午大痛不可忍遂臥少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛止得愈○此藥治病的切然猛烈氣虛血弱者不可輕用

皂莢七錢半
去皮子

礬石燒二錢半

五味子

蜀椒去汗

細辛乾量各半兩

右搗散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽不三行其瘕

即愈

導散方

皂莢炙去子

吳茱萸

當歸各一兩

蜀椒去汗

乾薑

大黃

戎鹽各二兩

細辛炒

礬石燒

五味子各二錢

右搗篩為散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中坐臥隨意勿行走小便時去之別換新者

療狐瘕方

取新死鼠一枚裹以新絮塗以黃土穿地坎足設鼠形置其中桑柴火灼其上一日一夜出之研為末肉桂心末二錢半酒服二方寸匕病當下甚者不過再服愈

療蛇瘕方

鳥頭魚骨

白芷

大黃

黃芩

芒硝各半兩

甘草大如指一尺炙

烏鰂魚骨二枚

皂莢六枚去皮弦子酥炙

右搗以水六升煮之三數沸絞去滓下硝適寒溫服之十日一

劑空腹服之瘕當下

療瘕瘕方

以上八瘕方有本來但須認症真耳

士卿不明

大黃一兩五錢

乾薑

側子各半兩

附子

人參

各三錢七分半

蜜蠱七寸

桂心

一兩二錢半

細辛

土鯁

各七錢半

白朮

一兩

右搗散以酒服方寸七日三

○治瘕瘕

穿山甲散

治婦人癥瘕及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢

瘕瘕

此方散結破血行氣消飲濕行指塊要藥也

此方破結氣散結血軟堅溫利亦可備用

猛峻之丸不可妄試

沙眼

卷三

穿山甲

灰炒燥

鼈甲

醋炙

赤芍藥

大黃

炒

乾漆

炒令

桂心

名兩

川芎

醋炒

當歸

各半兩

麝香

二錢半另可

右為細末入麝和勻每服一錢熱酒調下

蓬莪茂丸

治婦人癥瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

莪茂

七錢

當歸

焙

桂心

赤芍藥

檳榔

昆布

琥珀

研

枳殼

木香

各半兩

桃仁

鼈甲

大黃

各一兩

右為末煉密丸如桐子大食前米飲下二十丸

丁香丸

治婦人癥瘕結塊不散心腹疼痛

雄雀糞

炒黃

鼈甲

各一兩

硃砂

當歸

焙

芫花

醋炒乾

巴豆

去皮心油二分半

右為末研勻醋煮麵糊丸如小豆大當歸酒不三丸

桃仁

七錢

少

火

訶子皮

白朮

赤芍藥

右傷寒經久補者通胡凡如小豆大者歸而不一也

桃仁散 治婦人瘕痞心腹脹滿不能飲食體瘦無力

桃仁 一兩易浸去皮尖雙仁者燻炒令微黃 訶子皮 白朮 赤芍藥

當歸 各七錢半 京三稜 微炒 陳皮 去白 三兩 鼈甲 醋炙去甲 網一兩半

右為散每服三錢水一盞人生薑一錢三分煎至六分去滓食

前稍熱服○右方皆攻積之藥性多獷悍用者慎之

○治食積

化積丸 治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈雜眩

暈身熱時作時止

黃連 一兩五錢用吳茱萸益智各炒一半去吳智 蘿蔔子 香附 山楂 各一

川芎 山梔 炒 三稜 煨切 神麴 炒 桃仁 去皮尖 各五錢

右為末蒸餅丸服

此丹溪先生法也緣古方辛多再燥溫熱反能助火損氣此方以茱萸製連而治左以益智製連而治右以山楂消塊

中之火其餘
微氣消食散
血誠穩當藥
也

行氣消飲磨
積

小三稜煎丸

治食癥酒癖血痞氣塊時發刺痛全不思食及一

切積滯不消心腹堅脹痰飲嘔噦噫酸脇肋刺痛脾氣橫泄

三稜

莪朮

各四兩

芫花一兩

右同入磁器中用米醋五升浸滿封器口以灰火煨令乾取出
稜朮將芫花以餘醋炒令微焦同稜朮焙乾為末醋糊丸如棗
豆大一服十五丸生薑湯下婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如
水桑白皮煎湯下

礪砂丸

治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

礪砂

青礬石

穿山甲炙

三稜炒

乾漆

炒令
烟盡

硫黃

各半兩

巴豆

三十枚去皮
心炒不去油

右為末用軟飯丸如小豆大每服五丸生薑橘皮湯下

右為常用款款此知小豆大每服五丸生薑湯下

礞石丸。治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛。

青礞石 巴豆去皮 朱砂 粉霜并研 米香各二錢半 礞石雨

右研勻以糯米軟飯和丸如菉豆大每服二丸空心溫酒下取下惡物為度。右三方犯硃砂巴豆非胃氣強壯而積氣堅積勢不兩立者不可輕用也。

○治血癥

增味四物湯。治婦人血積。

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 三稜

義術 肉桂 乾漆炒烟盡各等分

右為釐末每服五錢水煎服。○余妻曾患小腹積塊每遇寒觸劇痛不可忍。諸醫治莫效。余用此一服立止。

治血積甚平

此方恐効遲
而腰肋重痛
須用行經藥
方効

平正效速

甚當

六合湯 治婦人經事不行腹中結塊腰肋重痛

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

酒洗

官桂

蓬朮

煨切各等分

右咬咀每服四錢水煎空心服

血竭散

治婦人血瘀作痛脇下脹滿月經不行發熱體倦

當歸

八分

芍藥

炒

桂心

血竭

蒲黃

炒香六分

玄胡索

炒四分

右爲細末每服二錢空心酒調下

牡丹散

治婦人久虛羸瘦血塊走心腹疼痛

牡丹皮

當歸

玄胡索

桂心

各一兩

赤芍藥

牛膝

莪朮

各三兩

京三稜

一兩半

右爲麤末每服三錢水酒各半盞煎服

當歸丸

治婦人月經不調血積證

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黃 廣茂 京三稜

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黃 廣茂 京三稜

神麴炒 百草霜 各二錢半

右為細末酒糊為丸如桐子大溫水下六七十丸

大黃散 治婦人血癥血瘕食積痰滯

川大黃 七錢半 碎微炒 龍甲 醋炙黃去 牛膝 去蘆 乾漆 一兩炒

右為末用米醋一升煎為膏每服一錢食前溫酒調下

大紅花丸 治婦人血積癥瘕經絡滯

川大黃 紅花 各二兩 蟲 十個去翅足

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸食後

溫酒下日三服

治腹中瘀血

桃奴散。治血蠱及瘀血停積。經水不通。男子跌撲損傷。皆效。

桃奴炒

猴鼠糞炒

玄胡索

肉桂

五靈脂

香附炒

砂仁

桃仁各等分

右為末。每服三錢。酒調服。

大黃湯。治婦人血瘀不消。及撲損血瘀。

大黃生用

桃仁湯浸去皮尖雙仁各一兩

桂去粗皮

郁李仁去皮研各半兩

生薑各一兩 地黃各一兩

右粗搗篩。每服三錢。水酒各半。蓋同煎至七分。去滓溫服。

琥珀散。治婦人經絡痞閉。腹內瘀血痛不可忍。

琥珀

乳香

沒藥各易研細末五錢

右每服二錢。水酒各半。蓋煎至七分。入地黃自然汁二合。再煎。

三物固妙而
入地黃汁尤
佳

佳

右每服二錢水酒各半煮至七成人也黃白然十二分

數沸去滓入溫酒服不拘時候

地榆散 治敗血

何首烏 有奇處

何首烏 肉桂 地榆 香白芷各等分

右為籠末每服二錢米泔一盞半沙糖一小塊煎至八分去滓

空心食前服

治症癖

麝香丸 治婦人瘕癖冷氣兼症氣心腹痛不可忍

此治氣血疾飲無往不可

麝香 另研

阿魏 二錢半麝香

五靈脂

三稜 各七錢半

桃仁 七錢 芫花 醋炒

檳榔 各一兩

莪茂 桂心 沒藥

木香 當歸 各半兩

右為細末入麝香令勻梗米飲飯為丸如桐子大每服十九淡

醋湯下無時

昔有一女人患腹中痞塊攻心作痛服此而愈

用獾猪肝一具可及十兩者以巴豆五十枚去大皮紫在肝內

用醞醋三碗熬肝極爛去巴豆不用入京三稜末和調得所丸

如桐子大每服五丸食前溫熱酒下

葱白散專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛又治婦

人胎前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血臟病冷百節倦

痛肌體怯弱勞傷帶瘕久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

與後烏鵲煎丸兼服

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 舶上懷香

芍藥 青皮 木香 麥芽 苦楝子 熟地黃 三稜

懷香若懷行下焦之氣木香

氣利厚朴行上焦之氣此方以四物補血人參助

重有冷氣不和理月胎前所宜片後血刺腹或血臟冷者宜之

人身以氣血

流行為元病

此方以四物

補血人參助

氣利厚朴

行上焦之氣

懷香若懷行

下焦之氣木香

青皮行肝氣
乾薑溫行血
中之氣其餘
消之削之皆
所以溫而行
之也氣一行
則痛自止矣
以溫引入血
分使氣下行
而主內以慈
引氣小通而
開表如是則
內外和而痛
愈也
女人休陰而
用陽其經行
以厥陰為主
雞黃與木性
通于肝肝氣
壯則血得其

棗茂 茯苓 神麴 人參各等分

右為細末。每服三錢。水一盞。連雞葱白二寸拍破。鹽半錢煎至七分。內大黃。調勻。宜相度病狀。如大便秘利。入大黃同煎。不入

鹽。如大便秘利。入調子煎。

烏雞煎丸。治婦人胎前產後諸般疾患。並皆治之。

烏雞一隻 烏藥 蛇牀 牡丹皮 人參 白朮

黃耆各一兩 蒼朮米滑浸切 海桐皮 肉桂去粗皮

附子炮去皮臍 川烏炮 紅花 白芍藥 蓬莖朮

陳皮各二兩 玄胡索 木香 肉荳蔻 熟地黃洗焙

琥珀 草果各半兩

右細剉。用烏雞一隻湯擇去毛及腸肚將上件藥安放雞肚

養而有生生之功若烏雄雞者具體陰用陽之象有水生木木生火之義益友人以助其體而性多熱滯故用此以鼓動肝氣而助其用耳本方用參芪白朮以益三焦之氣紅花熟地白芍以益心包肝腎之血氣滯而不行者若著脾鳥藥木香以調血而而不

中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油罈盛焙乾為細末煉蜜和丸如桐子大每服三十九

胎前產後傷寒蜜糖酒下 胎前氣悶壯熱炒薑酒下 赤白

帶下生薑地黃酒下 產後敗血注心薑子小便炒薑酒下

產後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下 胎前嘔逆薑湯下

催生炒蜀葵子酒下 安胎鹽酒下 室女經脈當通不通四

肢疼痛煎紅花酒下 血氣攻刺心腹痰痛煎當歸酒下 血

暈櫻欄燒灰酒調吞下 血悶煎烏梅湯研硃砂下 子宮久

冷溫酒或棗湯下空心日一服 血風勞人參酒吞下 小腹

疝痛炒茴香鹽酒吞下 血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆酒

下 常服溫酒醋湯任下並空心食前服 血邪研硃砂酒吞下

行。者。有。五。胡。丹。皮。琥。珀。以。行。之。因。寒。而。凝。有。烏。附。肉。桂。以。溫。之。其。諸。品。類。或。溫。中。以。醒。脾。或。清。穀。以。化。積。或。於。血。中。行。氣。或。於。氣。中。行。血。或。行。表。或。行。裏。皆。所。絕。之。以。氣。血。為。主。溫。行。為。用。而。又。以。開。胃。谷。氣。為。先。此。其。所。以。為。諸。病。可。服。也。其。自。治。胎。前。

酒下

夫。疔。癰。癰。瘰。血。氣。隗。硬。發。渴。刺。痛。甚。則。欲。死。究。而。言。之。皆。血。之。所。為。僕。嘗。治。一。婦。人。血。氣。刺。痛。極。不。可。忍。甚。而。死。二。日。方。省。醫。巫。並。治。數。年。不。愈。僕。以。葱。白。散。烏。雞。丸。遂。安。又。嘗。治。一。婦。人。血。氣。作。疔。如。一。小。盤。樣。走。注。刺。痛。要。一。人。扶。定。方。少。止。亦。用。此。二。藥。而。愈。尋。嘗。小。小。血。氣。用。此。二。藥。亦。有。奇。効。故。錄。于。此。朱。先。生。云。此。藥。大。治。心。氣。脾。疼。用。之。見。効。僕。嘗。以。此。治。浮。腫。立。効。陳。宜。人。病。血。氣。作。楚。痛。不。可。忍。服。諸。藥。無。効。召。僕。診。之。兩。關。脈。弱。沉。為。肝。脈。沈。差。緊。此。血。氣。漸。成。疔。癰。也。只。以。此。二。藥。治。之。而。愈。又。四。明。馬。朝。奉。後。晚。亦。病。此。用。藥。治。之。亦。愈。

四等丸 治婦人疔癰氣心腹疼痛飲食不消

諸疾則有所

未信

血邪者邪氣

之血阻血

疾自放散云

昔在月經

認塊要訣

有上下左右

之分而痰飲

食積亦須有

辨不可執泥

一說即此方

所用肉蔻草

果意可知矣

凡脈緊小沉

遲皆血凝氣

滯之脈

卷之三

名三

三二

大黃

剉碎微炒

訶梨勒法核

檳榔

木香

各等分

右為細末酒煮麵糊和丸如桐子大每食前以生薑橘皮湯下十五丸溫酒亦得

又方

繼用

醋炙黃去穢爛

川大黃

剉碎微炒

京三稜

炮製各等分

右為末醋煮麵糊丸如桐子大每食前以生薑湯下一丸

木香礪砂丸

治婦人瘕瘕積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消

久不瘥者

木香

礪砂另研

丁香

官桂

附子炮

乾漆炒烟

細墨

乳香另研

廣莪

青皮

沒藥另研

大黃剉碎為泰

京三稜

猪牙皂角

乾薑

炮各等分

巴豆霜

減半

若中濕火熱次下巴豆霜大黃散成膏為前藥末同巴豆霜子為

此服法根丹
溪先生意
須知女子之
病與男子不
同
按此疝瘕三
字雖相連然
以方觀之只
在疝字蓋
友人又有瘕
疝一症故其
大抵疝字之
義取其如山
之高而突起
也然何彼
皆連稱焉

右除硃砂乳香沒藥外同為末以好醋一升化開硃砂去滓銀
器中慢火熬次下巴豆霜大黃熬成膏將前藥末與膏子為丸
如麻子大併服三五十丸食後溫酒送下加至大便利為度
○右三方皆攻積之劑全無補性虛人禁用實者亦須以四君
子四物湯兼服乃可

○治疝瘕

乾漆散 治婦人疝瘕久不消令人黃瘦疝瘕兩脇妨悶心腹疼
痛

乾漆

炒令
烟盡

木香

羌活

醋炒

赤芍藥

桂心

當歸

川芎

琥珀

研各
半兩

大黃

炒二
兩

牛膝

七錢

桃仁

一兩

麝香

二錢
半

此方治肝經
居多

右為細末。每服一錢。溫酒調下。無時。

當歸散。

治婦人疝瘕。血氣攻刺。心腹疼痛。不可忍。

龍甲

醋炙二兩

當歸

剉微炒

桂心

檳榔

大黃

剉微炒各一兩

川芎

吳茱萸

湯炮七次

木香

青皮

去白各半兩

蓬莪茂

赤芍藥

桃仁

湯浸去皮尖炒微黃各七錢五分

右為散。每服三錢。薑一錢。三分水煎。熱服。不拘時。

硃砂丸。

治婦人疝瘕。及積瘀血在臍。時攻腹脇疼痛。

川芒硝

硃砂

各一兩

當歸

雄黃

桂心

各半兩

大黃

炮

三稜

各二兩

專在瘀血乃
涼行之劑是
知古人亦不
專主於熱矣
在人自擇之

右為細末。米醋一碗。熬大黃末為膏。次入餘藥末和丸。如桐子大。空心溫酒下十九。漸加至二十九。以利下惡物為度。

氣血痕食皆
宜弟藥太猛
慎之

此方以氣爲
主而血藥止
用一味然漆
有飛補之力
又可以一當
十也甚平穩
宜備用

巴豆丸 治婦人痢瘕及血氣疼痛

巴豆 去皮心醋煮 半日二錢半 礪砂 大黃炒各 一兩 五靈脂

桃仁 各七錢半 木香 半兩以土

右煉蜜丸如菉豆大 淡醋湯空心下五丸 熱酒亦可

黑神丸

神麴 藁香 各四兩 木香 椒炒香 丁香 各半兩

檳榔 四枚 漆 六兩半生半用重湯煮半日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒爲細末用前生熟漆和丸如彈子大又用懷香末十二兩鋪陰地蔭乾并懷香收器中至極乾去懷香治腎氣膀胱疝瘕及疝墜五膈血崩產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一九皆綿灰酒下一難產炒葵子

四十九枚搗碎酒煎下諸疾不過三服氣十服膈氣癥瘕

五服血瘕三九當瘥

一婦人病腹中有大塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸

盡三服杯氣盡消終身不作

晞露丸治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼痛

腰不得伸名曰腸覃

廣茂酒浸

三稜酒浸剉各一兩

乾漆泥去腥炒烟盡

川烏各五錢

硃砂四錢

青皮雄黃另研

茴香鹽炒

穿山甲炮各三錢

輕粉一錢另研

麝香半錢另研

巴豆三十個去皮切開

右除研藥外將巴豆炒三稜廣茂二味黃色去巴豆不用共為

末入研藥勻生薑汁打糊丸如桐子大每服二十九至三十

未入研藥勻。生薑汁打糊丸如桐子大。每服二十九至三十。

薑湯或酒下。空心食前服。

烏喙丸。治腸覃亦治乳餘并男子疝氣。

烏喙炮去皮各一錢

半夏湯洗四錢

石膏煨

藜蘆炒

牡蠣

茯苓

酒浸

桂心

乾薑

炮各一錢

巴豆

七個研膏

右為末。煉蜜丸如豆大。每服三五丸。食後酒飲在下。

見覘丹。治寒客於下焦。血氣閉塞而成瘕。日以益大。狀如懷子。

名曰石瘕。

附子

炮去皮癬四錢

鬼羽箭

紫石英

名三錢

澤瀉

肉桂

玄胡索

木香各一錢

血竭

一錢半另研

水蛭

檳榔

二錢半

桃仁

三十個另研

三稜

五錢

大黃

右為細末。用酒糊為丸如桐子大。每服三十丸。醋湯或溫酒下。

此小兒疳積
藥也。宜婦人
亦有之。大抵
以疳瘕之名
耳。出類集之

食前。

蘆薈丸。

治疳瘕肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝

疳食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等証。

蘆薈

胡黃連

黃連炒

木香

白蘼黃

炒青皮各五錢

當歸

茯苓

陳皮

各一兩半

甘草

炙七錢

右為末。米糊丸如桐子大。每服七八十丸。米飲下。

濟陰綱目卷之五終

關中 武之望叔卿父著輯 武林 汪之琦奇玉父訂正

濟陰綱目卷之六

關中 武之望叔卿父著輯 武林 汪之琦奇玉父訂正

西陵 汪 淇懌倚子箋評 天都 查 望于周父叅閱

○求子

○論求子須知先天之氣

胡氏曰男女交媾其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶爲後天滓質之物而一點先天真一之靈氣萌於情慾之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎爲要女以調經爲先而又參之以補氣行氣之說察其脉絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無不父女無

不母矣。

○論求子脉須和平

以尺寸浮沉
分氣血

陳楚良曰。人身氣血各有虛寔寒熱之異。惟察脉可知。含脉而獨言藥者妄也。脉有十二經。應十二時。一日一周與天同運。循環無端。其至也。既不宜太過而數。數則熱矣。又不宜不及而遲。遲則寒矣。不宜太有力而寔。非正氣能自定也。正氣虛而火邪來乘。以寔之也。治法先當散鬱。以伐其邪。邪去而後正可補也。不宜太無力而虛。虛乃正氣正血虛也。治法惟當補其氣血耳。亦有男婦上熱下寒。表實裏虛。而未得子者。法當臨睡時服涼膈之藥。以清其上。每晨食未入口時服補藥。以溫其下。暫進升散之藥。以達其表。及服厚味之藥。以實其裏。又有女人氣多血少。寒熱不調。月水違期。

又須分出氣
虛血虛不可
並補
宜有上下
治法分暑

生子要訣

聖婦人養
須熟此証治

瀉泄調經惟
子和可法
有積滯則汚
濁不清虛未

或後或先白帶頻下而無子者皆當診脉而以活法治之務欲使其夫婦之脉皆和平有力不熱不寒交合有期不妄用精必能生子子不殤夭故欲得子者必須對脉立方因病用藥

論求子先調經

婁氏曰求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕矣詳夫不調之由其或前或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也皆黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木香枳榔桃仁玄胡滯久血沉痼者吐之下之脉證熱者四物加芩連脉證寒者四物加桂附及

回則新生之
氣不鼓一味
香附有去舊
生新之妙

此五者非特
貴子者之良
藥亦可為
生者之莫方

紫石英之類是也。直至積去滯行虛回。然後氣血和平能孕子也。
予每治經不調者。只一味香附末。醋為丸服之。亦百發百中也。
論求子貴養精血

袁了凡先生云。聚精之道。一曰寡慾。二曰節勞。三曰息怒。四曰戒
酒。五曰慎味。今之談養生者。多言採陰補陽。久戰不泄。此為大謬。
腎為精之府。凡男女交接。必擾其腎。腎動則精血隨之而流。外雖
不泄。精已離宮。未能堅忍者。亦必有真精數點。隨陽之痿而溢出。
此其驗也。如火之有烟焰。豈有復反於薪者哉。是故貴寡慾。精成
於血。不獨房勞之交損吾之精。凡日用損血之事。皆當深戒。如日
勞於視。則血於視耗。耳勞於聽。則血以聽耗。心勞於思。則血於思
耗。吾隨事而節之。則血得其養。而與日俱積矣。是故貴節勞。主閉

火也。然則凡作事而相火動。則欲是者。用事而謂精不得其養。惟

藏者腎也。司疎泄者肝也。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。動則疎泄者用事。而閉藏不得其職。雖不交合。亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血。各歸其舍。則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤。手足俱紅。是擾其血而奔馳之也。血氣既衰之人。數月無房事。精始厚而可用。然使一夜大醉。精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云。精不足者。補之以味。然醲郁之味。不能生精。惟恬淡之味。乃能補精耳。蓋萬物皆有真味。調和勝而真味衰矣。不論腥素。淡煮之得法。自有一段冲和恬淡之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世間之物。惟五穀得味之正。但能澹食穀味。最能養精。又凡煮粥飯。而中有厚汁。滾作一團者。此米之精液所聚也。食之驟能生精。試之有效。○煉精有訣。全在腎家下手。內

玄關外之

三

內腎二字還

口訣

腎一竅名玄關外腎一竅名牝元其精未洩乾體未破則外腎陽

氣至子時而興人身之氣與天地之氣兩相脗合精魄體破而吾

身陽生之候漸晚有丑而生者次則寅而生者又次則卯而生者

有終不生者如與天地不相應矣煉之之訣須半夜子時即披衣

起坐兩手搓極熱以一手將外腎兜住以一手掩臍而凝神於內

腎久久習之而精旺矣

○論孕子必知絪縕之時

袁了凡先生云天地生物必有絪縕之時萬物化生必有樂育之

時猶犬至微將受娠也其雌必狂呼而奔跳以絪縕樂育之氣獨

之而不能自止耳此天然之節候生化之真機也世人種子有云

三十時辰兩月半二十八九君須筭此特言其大槩耳非的論也

二十時辰兩日生二十八九君須知此特言其大略耳非的論也

須得逆取之
道行之便是
築基此先天
氣生時也

今年十二而
子者所事之

丹經云。一月止有一日。二日止有一時。凡婦人一月經行不可必
有一日。綢緇之候。於一時辰間。氣蒸而熱昏而悶。有欲交接不可
忍之狀。此的候也。於此時逆而取之。則成丹。順而施之。則成胎矣。
其日。三日月出庚。又曰。溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆言其景象也。當其
慾情濃動之時。子宮內有如蓮花蕊者。不拘經淨幾日。自然挺出
陰中。如蓮蕊初開。內人洗下體。以手探之。自知也。但含羞不肯言
耳。男子預密告之。令其自言。一舉即中矣。
○論合男女必當其年

褚尚書求男論云。建平孝王姬姬皆麗無子。擇民家未笄女子八
御。又無子。問曰。求男有道乎。澄對曰。合男女必當其年。男雖十六
而精通。必三十而娶。女雖十四而天癸至。必二十而嫁。皆欲陰陽

常

方是求子法

盛衰之道在七損八益中

未實然後交而孕孕而育育而子堅壯強壽今未笄之女天癸始
 至已近男色陰氣早泄未完而傷未實而動是以交而不孕孕而
 不育育而子脆不育此王之所以無子也然婦人有所產皆女者
 有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人至宮詢有男之道也王
 曰善未再期生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也
 ○論男女精血盛衰

褚尚書曰飲食五味養髓骨肉血肌膚毛髮男子為陽陽中必有
 陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子為陰陰中
 必有陽陽之中數七故一七而陰血升二七而陰血溢陽精陰血
 皆飲食五味之秀實也方其升也智慮聰明齒牙更始髮黃者黑
 筋弱者強暨其溢也凡充身軀體手足耳目之餘雖針灸之

是以父一肢痛則子一肢不肖其父母一日虛則子一日不肖其

血場者濟自
夜精竭者必
血氣一以氣
及化血一
以血不及化
精一者病則
一般其為
又不止于此

右不下。凡子形肖父母者。以其精血當於父母之身。無所不歷也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父。母一目廢。則子一目不肖其母。精未通。而御女以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿。而思色以降其精。則精不出。內收小便道澀。而為淋。精已耗。而復竭之。則大小便道窄疼。愈疼則愈欲。大小便愈便則愈疼。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年思男大合。亦不調。不調則舊血不出。新血誤行。或漬而入骨。或變而之腫。或雖合而難子。合男子多。則瀝枯。虛人產乳衆。則血枯。殺人觀其精血。思過半矣。

○論成胎分男女之異

褚尚書曰。男女之合。二精皆陽。陰血先至。陽精後衝。血開畏精。精

八爲骨而男形成矣。陽精未入陰血後參精開裏血入爲骨而女形成矣。陽氣聚面故男子而重。溺死者必伏。陰氣聚背故女子而重。溺死者必仰。走獸溺死仰伏皆然。陰陽均至非男非女之身。精血散分。斬胎品胎之兆。父少母老產女必羸。母壯父衰生男必弱。古之良工。首察乎此。氣受偏瘁與之補之。補羸女則養血壯脾。補弱男則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外所務之本不可不察也。

丹溪曰。成胎以精血之後先分男女者。褚澄之論也。愚竊惑焉。後關東垣方有曰。經水斷後一二日血海始淨。精勝其血感者成男。四五日後血脈已旺。精不勝血感者成女。此論亦爲未瑩。何以言之。易曰。乾道成男。坤道成女。夫乾坤陰陽之性情也。左右陰陽之

曰柔右

道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血因感而會。精之泄陽之施也。血能攝之。陰之化也。精成其胎。此萬物資始於乾元也。血成其胎。此萬物資生於坤元也。陰陽交媾。胎孕乃凝。胎之所居。名曰子宮。一系在下。上有兩岐。一達於左。一達於右。精勝其血。及剛日陽時感者。則陽爲之主。受氣於左子宮。而男形成。精不勝血。及柔日陰時感者。則陰爲之主。受氣於右子宮。而女形成。或自分男分女。吾知之矣。其有雙胎者。將何知。曰。精氣有餘。岐而分之。血因分而攝之故也。若夫男女同孕者。剛日陰時感。柔日陽時感。則陰陽混雜。不偏左。不偏右。受氣於兩岐之間者也。亦有三胎四胎五胎六胎者。猶是而已。或曰。其有男不可爲父。女不可爲母。與男女之兼形者。又若何而分之。予曰。男不可爲父。得陽氣之虧者也。女不

可爲母得陰氣之塞者也。兼形者由陰爲駁氣所乘而爲狀不一。以女兼男形者有二。一則遇男爲妻。遇女爲夫。一則可妻而不可夫。又有下爲女體。上具男之全形。此又駁之者也。或曰駁氣所乘獨見於陰。而所乘之形又若是之不同耶。予曰陰體虛。駁氣易於乘也。駁氣所乘陰陽相混。無所爲主。不可屬左。不可屬右。受氣於兩岐之間。隨所得駁氣之輕重而成形。故所兼之形有不可得而同也。

○論男女各由百脉齊到

程鳴謙云。褚澄氏言。男女交合。陰血先至。陽精後衝。而男形成。陽精先入。陰血後聚。而女形成。信斯言也。人有精先洩而生男。精後洩而生女者。獨何歟。東垣曰。經水纔斷一二日。血海始淨。感者成。

男四五日血脈已旺感者成女至於六七日後則雖交成亦不成胎信斯言也人有經始斷交合生女經久斷交合生男者亦有四五日以前交合無孕八九日以後交合有孕者獨何歟俞子木撰廣嗣要畧著方立圖謂實陽能入虛陰實陰不能受陽即東垣之故見也又謂微陽不能射陰弱陰不能攝陽信斯言也世有尪癯之夫怯弱之婦屢屢受胎雖欲止之而不能上者亦有血氣方剛精力過人顧乃艱於育嗣而莫之救者獨何歟朱丹溪論治專以婦人經水爲主然當貴之家侍妾已多其中寧無月水當期者乎有已經前夫頻頻生育而娶此以圖其易者顧亦不能得胎更道與他人轉盼生男矣豈不能受孕於此而能受孕於彼乎愚以爲父母之生子如天地之生物易曰坤道其順乎承天而時行夫知

水天之行乃
地之生物
知母之順承乎父
則種子者果以婦人為主乎
以男子為主乎
然所謂主於男子者不拘老少強弱康寧病患精易洩難洩只以交感之時百脉齊到為善耳
交感而百脉齊到雖老弱病患精易洩難洩亦可以成胎
交感而百脉參差雖少強雖康寧雖難洩亦難以成胎
矣婦人所構之血固由於百脉合聚較之男子之精不能無輕重之分也
孔子贊乾元資始曰大贊坤元資生曰至得無意乎
若男女之辨又不以精血先後為拘不以經盡幾日為拘不以夜半前後交感為拘
不以父強母弱母強父弱為拘只以精血各由百脉齊到者別勝負耳
是故精之百脉齊到有以勝乎血則成男矣血之百脉齊到有以勝乎精則成女矣
至有既孕而小產者有產而

修短耳世人不知其精血之氣主龍已定於父母之精乃以小產

之百脈齊到者以胎平滿則成女矣。至有斷孕而小產者有月經不

不育有育而不壽者有壽而黃青無疆者則亦精血之堅脆分俾
修短耳。世人不察其精血之堅脆已定於稟受之初。乃以小產專
責之母。以不育專付之舅。以壽夭專諉之數。不亦謬乎。

○趕經法

經有不可趕
者謂女人之
經有一年一
月行者有四
季行者

求嗣全書載趕經調和訣云。有一女人月經來時專在下弦之期。
必用養血之法以逐之。視其色紫則知血熱。服涼血藥以緩其氣。
則氣血和而來遲。漸漸趕之。定到初頭。視其色淡短少者。則服養
血和血藥。養其命門。亦赶到初頭。察女人肥瘦。強弱而用藥。一月
便不能合。趕之之久。定到上弦。此趕經之法也。以女人上弦交多
生男耳。又有一等女人身體肥胖。子宮脂膜長滿。經水雖調。亦令
無子。須服開子宮之藥。以消其脂膜。

胚胎兆于一
氣。胎者氣之
形。育者氣之
性。以形之
著。外人以制
生化。故以水
火金木土石
制而化焉。後
天順序而成
故以木火土
金水相生而
養。以逆而化
以順而成。自
然之妙也。

卷之五

袁先生云。巢氏論婦人妊娠。一月名胎胚。足厥陰脉養之。二月名始膏。足少陽脉養之。三月名始胎。手少陰脉養之。四月始受水精以行血脉。手少陽脉養之。五月始受火精以成其氣。足太陰脉養之。六月始受金精以成其筋。足陽明脉養之。七月始受木精以成其骨。手太陰脉養之。八月始受土精以成膚革。手陽明脉養之。九月始受石精以成毛髮。足少陰脉養之。十月臟腑闔節人神俱備。足太陽脉養之。此其大略也。若求其細。則受胎在腹。七日一變。展轉相成。各有相生。大集經備矣。今婦人墮胎。在三月五月七月者。多在二四六月者。少。臟陰而腑陽。三月屬心。五月屬脾。七月屬肺。皆在五臟之脉。陰常易虧。故多墮耳。如昔曾三月墮胎。則心脉受

皆在五臟之氣。當易。故多。耳。如。日。皆。三。月。產。胎。則。心。氣。之。傷。先。須。調。心。不。然。至。三。月。復。墮。昔。曾。五。月。墮。胎。則。脾。脈。受。傷。先。宜。治。脾。不。然。至。五。月。復。墮。惟。有。一。月。之。內。墮。胎。則。人。皆。不。知。有。胎。但。知。不。受。妊。不。知。其。受。而。墮。也。一。月。屬。肝。怒。則。墮。多。洗。下。體。則。竅。閉。亦。墮。一。次。既。墮。則。肝。脈。受。傷。他。次。亦。墮。今。之。無。子。者。大。半。是。一。月。墮。胎。非。盡。不。受。妊。也。故。凡。初。交。之。後。最。宜。將。息。勿。復。交。接。以。擾。其。子。宮。勿。令。怒。勿。令。勞。勿。令。舉。重。勿。令。洗。浴。而。又。多。服。養。肝。平。氣。之。藥。胎。可。固。矣。

○論痰飲不孕

張子和云。戴人過譙都營中飲會。有一卒說出妻事。戴人問其故。答曰。吾婦爲室女時。心下有冷積如覆盆。浚之如水聲。以熱手慰之如冰。娶來已十五年矣。越斷吾嗣。是以去之。戴人曰。公勿黠也。

此藥非子
和生不能

如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其脉寸脉沉而遲尺脉
洪大有力非無子之候也可不逾年而孕其良人嘆曰試之先以
三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物
湯和之不再月氣血合度數月而娠一子戴人常曰用吾此法無
不子之婦此言不誣○一婦人年三十四歲夢與鬼神交驚怕異
常及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無姪姪巫祈覲福
無所不至鑽肌炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿足腫委命於
天一日苦請戴人戴人曰陽火盛於上陰水盛於下見鬼神者陰
之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用兩手寸脉皆沉而伏知胸
中何是疾也凡三湧三泄三汗不旬日而無夢二月而有娠

○論求子禁用熱劑

處通問古今人推秦桂九其言確其意專用溫熱藥近平人情然

妙在溫和二
益大寒大
物故也

丹溪秦桂丸論曰。無子之因。多起於婦人。醫者不求其因。起於何處。遍閱古方。惟秦桂丸。其辭確。其意專。用溫熱藥。近平人情。欣然受之。銳然服之。甘受燔灼之禍。猶惜然不悔。何者。陽精之施。陰血能攝之。精成其子。血成其胞。胎孕乃成。今婦人之無子者。率由血少。不足以攝精也。血之少也。固非一端。然欲得子者。必須調補陰血。使無虧欠。乃可推其有餘。以成胎孕。何乃輕用熱劑。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵矣。或曰。春氣溫和。則萬物發生。冬氣寒凜。則萬物消損。非秦桂丸之溫熱。何以得子。臟溫煖而成胎耶。予曰。詩曰。婦人和平則樂有子。和則血氣均平。則陰陽不爭。今得此藥。經血必轉紫黑。漸成衰少。或先或後。始則飲食驟進。久則口苦而乾。陰陽不平。血氣不和。疾病蜂起。焉能成胎。縱然成胎。生子亦多病。

此註最當

而不壽。以秦桂丸耗損天真之陰也。戒之慎之。人而受其丸數。胎調理補藥亦無效。但忌施于瘦人火多者也。

○論孕子雜法

艾性雖熱。是性下寒。寒者宜之。

丹溪曰。婦人無子者。多由血少。不能攝精。初醫悉謂子宮虛冷。托以辛熱之藥。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵。或有服艾者。不知艾性至熱。入火炙則下行。入藥服則上行。多服則致毒。咎將誰晚。○若是肥盛婦人。稟受甚厚。熱於瀾。宜之人。經水不調。不能成胎。謂之軀脂滿溢。閉塞子宮。宜行濕燥痰。用星半。蒼朮。台芎。防風。羌活。滑石。或導痰湯之類。○若是瘦怯性急之人。經水不調。不能成胎。謂之子宮乾澀。無血不能攝受精氣。宜涼血降火。或四物湯加香附。黃芩。柴胡。養血養陰等藥。○東垣有六味地黃丸。以補婦人之

六味丸異驗

薛氏曰。婦人之不孕。亦有因六淫七情之邪。有傷衝任。或宿疾。

六步九氣... 附註... 東垣有六味地黃丸以補婦人...

陰血不足無子服之者能使胎孕

薛氏曰婦人之不孕亦有因六淫七情之邪有傷衝任或宿疾滯

留傳遺臟腑或子宮虛冷或氣旺血衰或血中伏熱又有脾胃虛

損不能營養衝任審此更當察其男子之形質虛實何如有腎虛

精弱不能融育成胎者有稟賦元弱氣血虛損者有嗜慾無度陰

精衰憊者各當求其源而治之至於大要則當審男女之尺脉若

左尺微細或虛大無力者用八味丸左尺洪大按之無力者用六

味丸兩尺俱微細或浮大者用十補丸若誤用辛熱燥血不惟無

益反受其害

○脉法

素問曰督脈生病女子不孕

夜青極當滅
度

豈此三方所
能盡且擴充
之

脈經云婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之

絕產○脈微弱而瀉年少得此為無子中年得此為絕產○肥人

脈細胞有寒故令少子其色黃者胸中有寒

○治血虛不孕

加味四物湯 治婦人不孕久服有子甚好

當歸 川芎各二錢 白朮微炒

熟地黃酒洗各一錢半 白茯苓 芍藥微炒 續斷

阿膠各二錢

香附醋煮八分 橘紅七分 甘草炙三分

右剉水二鍾煎八分食遠服

加味四物湯 治血氣兩虛不孕

當歸酒洗 白芍藥炒 肉蓯蓉各一錢 熟地黃酒洗

極穩當但氣壯血熱者須去芍朮而當歸味辛有熱症者亦須裁酌

內藏藥治絕陰不產

右剉水煎服○每月經前三服經正行三服經行後三服

白芍藥

當歸

白芍藥

肉桂

熟地黃

白朮

白茯苓各一錢

人參五分

川芎三錢

右剉水煎服。○每月經前三服。經正行三服。經行後三服。

調經種玉湯

凡婦人無子。多因七情所傷。致使血衰氣盛。經水

不調。或前或後。或多或少。或色淡如水。或紫如血塊。或崩漏帶

下。或肚腹疼痛。或子宮虛冷。不能受孕。宜此藥。有發百中効可

通神。

妙在吳茱萸

當歸酒洗

川芎

吳茱萸炒各四錢 熟地黃酒洗

香附炒各六錢

白芍藥

白茯苓去皮

陳皮

牡丹皮

玄胡索各三錢

右剉作四劑。每一劑加生薑三片。水一碗半。煎一碗。空心溫服。

渣再煎。臨臥服。待經至之日。服起。一日一劑。藥盡。經止。則當交

媾。即成孕矣。縱不成孕。經當對期。俟經來再服四劑。必孕無疑。

妙在調氣

一味薄切
妙在鹿角屑

○若過期而經水色淡者加官桂炒乾薑熟艾各三錢○若先期三四日色紫者加條芩三錢

經驗育胎丸 治婦人久無子嗣服此經調而盛子宮溫煖成孕孕後服之可保胎氣堅固

當歸酒

熟地黃酒 蒸白朮

香附各四兩 砂仁三兩

芍藥酒炒

川芎

川續斷酒洗 陳皮

黃芩酒炒各二兩

右為細末糯米糊丸如桐子大每服七八十丸空心淡醋湯下酒亦可以乾物壓之

婦人歸附丸 不但種子且無小產產後諸證

香附子

大者砂礮內醋者極熟水洗焙乾為末一筋

當歸

大者片苦酒洗切片薄乾為末十兩

右三味酒洗... 起臨睡各一服

當歸狀如馬尾者切用見曹氏

鹿角大者兩斤去脂切末二三兩細碎 熟鐵鍋內文火炒為細末用二兩

右三味和勻醋糊丸如桐子大每服三錢早起臨睡各一服白

滾湯下一片經後八房即孕

神仙附益丸 不惟治婦人百病而生育之功効如神

香附米一斤用童便浸透取出水洗淨露一宿晒乾再浸再露再晒如此二次用

益母草十二兩東流水洗淨烘乾為末

右再用香附四兩北艾一兩煮汁用三分醋七分和前藥為丸

如桐子大每服五七丸空心臨臥淡醋湯下

加味地黃丸 治婦人久無孕育者効如影響

熟地黃四兩 山茱萸肉 山藥各二兩 白茯苓 牡丹皮各一兩

澤瀉 香附子童便炒各一兩 斷艾醋煮五錢

血熱者不宜 艾附加艾此 亦似回蛇添 足

不雜血藥而 能調血不致 香而能調 氣在胎前產 後俱可以謂 之仙方亦宜

右為末煉蜜凡如桐子大每服七八十九滾湯下

金蓮種子仙方一名夢熊丸有小茴香二兩無熟地黃 女人服之有孕

熟地黃酒洗 當歸酒洗 白芍藥酒炒 益母草 川芎酒洗 蒼朮

米泔水浸宿各三兩 蛇床子酒洗 條芩酒洗 覆盆子炒

玄胡索微炒 陳皮水洗各二兩 砂仁去皮一兩五錢 山茱萸酒浸

去核附五兩

右為極細末先用白毛烏骨雄雞一隻預先喂養一月勿令與

雌雞同處臨時將雞緝死不出血乾去毛剖開去腸內汚物并

絲肉宿食臍內黃皮用酒洗淨一應事件仍裝入雞肚內不令

見水置壘內入酒二觔封固重湯煮爛取出割下淨肉搗如泥

仍將雞骨用酥油和原汁或酒炙餽為末入前藥末內拌勻

山有疑 宮失出之當 可無他藥之 則宜按時候 以條芩佐之 移其下而久 蛇床山茱萸 溫經此則以 美等熱藥以 仁等藥以 行氣以 砂仁以

十九漸至八九十九空心中清水飲下○如月信先期而至者加

此方加法服
法尤為精當
可規諸方而
變通之理又
顯顯是道矣
玩之玩之

以姜汁浸地
黃以醋煮焚
者有竅刻等
分亦是一法

服法須知

用醋煮米糊同雞肉左利內搗極細為丸如桐子大每服四五
十丸漸至八九十丸空心清水飲下○如月信先期而至者加
黃芩地骨皮黃連各一兩半清水飲下○如月信後期而至者
加黃芩一兩人參白朮各一兩半溫酒或淡鹽湯下○如白帶
者加蒼朮白朮并麻白芷各一兩半淡薑下

百子建中湯 女人服此藥調經養血安胎順氣不問胎前產後
月事參差有餘不足諸證悉皆治之

當歸酒洗

南川芎

白芍藥

酒炒

熟地黃

姜外

真阿膠

蛤粉炒成

珠

蘄艾葉

醋煮各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服八十丸空心百沸湯點醋少
許下內寒者溫酒下

此平順之劑
而麥門黑豆
亦心腎藥也
而以厚山熟
地用能無功
過相掩乎

此妙在澤蘭
蠅蛸而學者
尤須看症的
確熟察本草
便能得方中
三昧矣

加味養榮丸

此方服之有孕且無小產之患

當歸酒

熟地黃酒

白朮

芍藥

川芎

黃芩

香附

各一兩半

陳皮

貝母

去心

茯苓

麥門冬

去心各一兩

阿膠

甘草

炙各五錢

黑豆

炒去皮四十九粒

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸食前空心白湯酒

任下忌食諸血

加味香附丸

男服聚精丸女服此

香附

一斤

分四分

一分

酒浸

二宿

搗碎炒

一分

米醋浸

上

浸同

澤蘭

淨葉六兩

酒洗

海螵蛸

六兩

搗碎炒

當歸

四兩

酒洗

川芎

三兩

白芍藥

四兩

酒炒

熟地黃

八兩

搗碎

右為末用浮小麥麩酒醋水打糊為丸如菜豆大每日早晚兩

大五神丸 瘦人無孕乃無血攝精宜潤

此三子係男
人藥也借以
治婦人之無
嗣長正所謂
因病以藥
勿拘方以治
病

服白湯酒任下忌食菜蔬及羊肉生冷

大五補丸 瘦人無孕乃無血攝精宜潤

天門冬去心 麥門冬去心 菖蒲 茯苓 人參 益智

枸杞子 地骨皮 遠志肉 熟地黄各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心酒下服本方數

服後以七宜丸泄之

增損三才丸

天門冬酒浸去心 熟地黄酒蒸 人參 遠志去心 五味子

茯苓酒洗 鹿角酥炙

右為細末煉蜜杵干下為丸如桐子大每服五十丸空心好酒

下○年老欲補加泔元衣即頭生兒胎衣全個酒浸晒乾為末

細閱此方不用芍藥而用木香其意在行肝而不欲肝也殊不知胎之墮又苦於血之行故凡艾附之類俱用醋製以醋入肝有微陽之氣交可以調血也其加松烟亦為固血而設且其如阿膠

八藥 一方加白馬莖酥炙○一方加附子補相火不足○一

方加麥門冬令有人力○一方加續斷以續筋骨○一方加沉

香煖下焦虛冷

補効聖附丸 治婦人久無子而經事不調及數墮胎者服之可

立致効

香附 一斤分四份用米醋煮乾便鹽水酒各發一日夜絹艾四兩用米醋二碗同香附

白茯苓 人參 當歸 川芎 熟地黄酒浸

上等礬墨火煨醋粹木香錢五

右九味各另為末醋糊丸如桐子大每服五十丸空心好酒下

青蒿烏雞丸 婦人服能令多子

青蒿 即野蒿五斤月採香附子童便鹽水酒醋各浸四兩炒共一斤斷艾醋煮

積聚

人參

白朮

川芎

熟地黃

秦當歸酒洗一宿炒 牡丹皮 地骨皮 白芍藥酒洗 黃耆蜜炙

茯苓 人參 白朮 川芎各一兩 鱉甲醋煮一兩五錢

右爲細末取白毛烏骨雄雞一隻初發聲者絞殺乾去毛不用水湯亦不用水洗惟用水去脚上粗皮用好酒入磁器內同熟地黃二兩煮雞熟去骨合前藥搗爛作餅復晒乾爲末仍用煮雞酒調糯米粉爲糊凡如桐子大每服七八十丸酒下日三服不拘時一月見効造藥忌鐵器

大烏雞丸 治女人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下不能成胎及骨蒸等證

香附一斤四製 熟地黃兩四 生地黄 當歸 白芍藥 人參各兩

川芎 鱉甲各三兩半 白朮 黃芪 牛膝 柴胡 牡丹皮

知母 貝母各一兩 黃連 地骨皮 玄胡索 乾姜各一兩

白茯苓二兩半 秦艽一兩半 艾葉 青蒿各四兩

右各附等二十一味。其為細末。用白毛烏骨雞一隻。緝死。去毛與腸。將艾蒿各一半。裝入腹內。將雞重餘艾蒿同入堦內。以童便和水。浸過雞二寸許。隔湯煮爛。取出去骨。焙肉乾為末。如有筋骨疼痛者。去肉焙骨焦為末。與前末和勻。雞汁打糊為丸。如桐子大。每服五六十丸。漸加至七八十丸。溫酒或米飲下。忌煎炒菓菜。

小烏雞丸 治婦人百病

吳茱萸 良姜 白姜 當歸 烏芍藥 玄胡索
波故紙 川椒 陳皮 劉寄奴 生薑黃 莪朮

巧只在荷葉
狀一味

用鳳凰衣更
巧中之巧

此方大勝非
胎不安者所
宜

腸風漏血又
安男之

斑猶太毒不
可妄試

赤痢之用亦
在荷葉乎

川芎各一兩 荷葉灰兩 杜艾兩

右爲末。用白毛烏骨雞雞死。煮爛去骨。取肉搗如泥。拌藥末。晒

乾。磨細。以雞汁作糊爲丸。如桐子大。每服五十九。空心隨引下。

○如從來未曾生育者。乃油膜包裹子宮。以致不能生氣成孕。

宜加鳳凰衣燒存性七個。硃砂爲衣。○如腹痛血黑色者。加炒

黃連。有濕痰者。加南星。麝米香附同丸。○月水不通。紅花蘇木

酒下。○子宮久冷。扶芩煎湯下。○赤帶清茶下。○白帶牡蠣粉

調酒下。○血成豆淋酒調綿灰下。○胎不安。蜜酒下。○腸風陳

米飲調百草霜下。○心痛。薑蒲酒下。○腹痛。芍藥酒下。○胎漏

下血。烏梅酒下。○胎死不動。斑猶三個調酒下。○胎衣不下。薑

薑某研水下。○胎前產後白痢。乾姜煎湯下。○赤痢。甘草煎湯

頭風眼黑俱
宗書慶義
生瘡豈可用
熱藥

初陽經

卷二

下○耳聾腦茶清下○頭風薄荷煎湯下○血風眼黑甘草湯
下○身體疼痛黃芪末調酒下○腰脚痛當歸酒下○生瘡地
黃煎湯下○氣血塊作痛與葱白湯調服○四肢浮腫麝香
湯下○咳嗽喘滿杏仁桑白皮煎湯下○當服溫酒醋任下

十全濟陰丸

方論曰胎嗣主於濟陰者何也蓋人之所秉陽當

有餘陰常不足氣常有餘血常不足在女人癸水易虧而難盈
以至不生育方多以辛香熱燥之劑為溫煖子宮偏助陽氣反
耗陰血豈能成胎况女性多氣多鬱氣多則為火鬱多則血滯
故經脈不行諸病交作生育之道遂阻矣又如脾胃虛弱者偏
用四物涼血等藥則脾胃益虛飲食頓減使氣血無資生之地
何以得成胎為子嗣之計者莫如養血順氣調經為本而兼

以甘溫養脾辛溫開鬱斯爲至當且調經之法又當因人而加減之初無一定之法也此方則以當歸以養血和氣爲君入手少陰經以心主血也入足太陰經以脾畏血也入足厥陰經以肝藏血也熟地黃補腎中元氣生心血與芍藥同用又生肝血川芎乃血中之氣藥下行血海通經氣爲臣人參通經活血助熟地黃以補下元白朮利腰膀間血與人參同用補益脾氣香附疎氣散鬱佐澤蘭能生新血而和平氣體牡丹皮養新血去壞血固真氣行結氣山藥能強陰補虛枸杞子補腎水而止下血腰疼爲佐紫石英補心氣散心中結氣填補下焦艾葉助香附和百脉溫子宮兼行血藥而平其寒效如神通經脉血氣而和諸藥其緩肝經之急爲使十年不孕者此藥主之

酒熟地黃

香附子

帝便煮
各四兩

乾山藥

白朮

各二兩
五錢

梅杞子。

人參

新交錄

名物

二兩同香附用陳
煮一時搗爛焙乾

川芎

白芍藥

牡丹皮

此邦有英

兩部

卷之四

一
些
河
車

在一
淨其

水內燒土，燒面用。

銀針和去黑頭

右各藥俱切片同河車入砂鍋內用陳老酒三碗陳米醋一碗

清白薑便一碗米泔水數碗和勻傾入鍋內浮於藥上如尚

少再加米泔以鍋蓋蓋密勿令透氣桑柴火慢煮以河車融化

汁乾爲度同藥俱取出在石臼內搗極爛捻作餅子日晒夜露

三畫後宜在月滿之時以爰日精月華仍煇乾爲末煉密搗干

餘性丸如桐子大每服五十丸漸加至八九十丸空心淡鹽湯

隨用星飯使蟻下行。食生蘿菔。凡月經過期而行。或少

新刊

在氣血虛
之人而先類
者將行腹痛
若經水紫黑
者用人濕者
婢妾多變者
如暗之類昔
非所宜雖有
加減亦須斟酌

或不行皆血寒血少也。尺脉必微弱。加桂心五錢。夏月三錢。黃芪一兩。灸。先期而來者血熱也。脉來必數。加條實黃芩二兩。炒酒製生地黃一兩五錢。腹痛加白芍藥一兩。凡經將行而腹中先作痛者。血實而氣滯也。去血成塊者。氣凝也。脉來弦數滑大。加玄胡索一兩。炒酒。陳皮八錢。廣木香柴胡稍各五錢。凡經水行後作痛者。氣血俱虛也。尺脉必虛澁而兼緊。加炒乾姜三錢。白茯苓一兩。桂心夏月二錢。餘月五錢。凡經行三五日後腹中綿綿作痛。或淋瀝不止。血因氣滯未盡也。尺脉見沉澁。或沉弦。加廣木香五錢。柴胡六錢。凡經水紫色及黑色。血熱之甚也。尺脉見洪數。加條實黃芩一兩。黃柏一兩。炒。生地黃一兩五錢。酒浸。凡過期行經而色淡者。肥人則有濕痰。加白茯苓。水

或來或斷或
寒熱者此肝
經及心包絡
氣血不調

以多崩漏而
減香附艾葉
加荆樺黃芩
則治崩漏皆
可想矣而阿
膠乾姜黃芪
之治崩又可
想其意也
身溫淫至
止小其苦心

陳皮蒼朮

水泔浸一宿
刮水炒

各一兩白朮五錢減去熟地黃一兩瘦天

則血虛少而水混之加桂心五錢經行或來或斷或發寒熱夫

加柴胡八錢白茯苓一兩。凡經脈不調多白帶者肥人主胃

中濕痰流注加製過蒼朮白茯苓各一兩五錢減熟地黃一兩

○凡瘦人氣多血少脾虛加木香五錢牡蠣火赤石脂火白茯苓

苓各一兩。○凡多崩漏者減香附艾葉各一兩加荆芥穗炒一

兩黃芩一兩五錢血崩或多或少加阿膠珠一兩乾姜五錢炒黃芪

一兩多。元氣虛弱經水閉者加牛膝二兩酒洗屬寒加桂心五

錢屬熱加黃芩一兩酒炒。凡婢妾素見忌於嫡室者必多抑鬱

以致經水不調加味製香附二兩或血弱心虛交感時驚恐不

寧則精氣不聚加琥珀砂酸棗仁隔紗茯苓神各一兩辰砂水飛

家則補氣不聚加琥珀砂或東辰一二兩炒扶神各一二兩長砂

石莖各五錢
治宮冷不孕

衝為血海任

調生丸 一各說

治婦人衝任虛寒胎孕不成成多損墜

上胞胎此方

澤蘭葉

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥

牡丹皮

以白木石角

玄胡索

石斛

白木

乾姜

肉桂

去皮各

皮玄胡索

右為末醋糊

丸如桐子大每服五十丸空心酒下

中之襪乾姜

調氣煖宮丸

肉桂煖子宮

當歸

川芎

肉桂

白芍藥

香附

艾葉

醋炒

新溫中益胃

阿膠

蛤粉炒成

亦溫和之正

右為末醋糊

丸如桐子大每服五十丸食前米湯下

不用地黃恐

艾附煖宮丸

治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢疼痛

齊金綱目

卷六求子諸方

二十

此方製而最妙分兩極置

此方妙在配合及酒浸三日之功

倦怠無力飲食減少經脉不調血無顏色肚腹時痛久無子息服藥更能戒惱怒生冷累用經驗

香附子

六兩用醋五斤以砂石罐煮一晝夜鳩爛成餅慢火焙乾

艾葉

大者去枝梗

川芎

酒洗各三

兩大川芎

吳茱萸去梗黃芪

白芍藥

淡酒炒續斷各二兩

去虛一兩五錢

生地黄

酒洗一兩官桂錢五

右共為細末用上好醋打糊凡如桐子大每服五七十九淡醋湯食遠下擇壬子日或天德月德日修合

勝金丸

一名女金丹

治婦人久虛或產後失調觸犯禁忌斷產少子

及經事遲來赤白帶下腰脚重痛寒熱不。一身體瘦削眩暈嘔逆此藥善調經候。每日一丸若胎前三日一丸產後二日一丸去一切雜證。効難具述。珍之寶之。

去一切雜藥。功難具述。亦之寶之。

香附子上五兩醋浸三日 當歸 川芎 白芍藥 人參 白朮

茯苓 甘草炙 桂心 白薇 玄胡索 牡丹皮 葵本

香白芷 沒藥研 赤石脂另研各一兩

右除香附沒藥赤石脂其餘十三味用好酒浸三日去酒晒乾
通前香附一處為末方入沒藥石脂煉為丸如彈子大每服
一丸五更初嚼服溫酒送下白湯亦可此藥多在四十九丸後
以癸水調平受孕為度倘有孕依前三日一服無所忌戒○一
方去沒藥加沉香○一方去桂心加熟地黃丸如桐子大每服
五十丸空心溫酒或白湯下以乾物壓之

白薇丸 治婦人月水不利四肢羸瘦虛乏

當歸 白薇 栝子仁 白芍藥 川芎 白朮 桂心

以通利則可
以不羸則名

之補氣行
血則是以治
熱地非

附子 革薢 木香 檳榔 細辛 吳茱萸 各五錢

人參 白茯苓 石斛 川牛膝 澤蘭葉 各七錢半 牡丹皮

紫石英 各一兩 熟地黃 二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十九空心溫酒下

白薇丸 治婦人經子或斷經上熱下冷等病皆主之

白薇 熟地黃 川椒 去目及閉口者微炒出汁 白龍骨 各一兩 麥門冬

去心一兩半 藥木 卷柏 白芷 覆盆子 桃仁 湯浸去皮尖及仁麤微炒

黃人參 白茯苓 桂心 菖蒲 遠志 去心各七錢半

車前子 當歸 微炒 茜莖 蛇床子 細辛 乾姜 炮谷五錢半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心日午溫酒下○

昔有數人無嗣俱用此方踰年而皆有子故述之

昔有數人無子俱用此方踰年而皆有子或進之

秦桂丸 治婦人血海久冷不能孕育

附子 一方用 白薇 半夏 茯苓 杜仲 厚朴 當歸

秦艽 各三 防風 肉桂 乾姜 牛膝 沙參 各二兩

細辛 人參 各四

有煖溫經之治而無精血不和之性非真陰寒者不可服內有沙參未知其解

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心酒下無効更加丸數經調受補者服七日即交合孕後忌服

艾附丸 此藥能煖子宮胎前產後各隨飲用

當歸 芍藥 熟地黃 生地黃 香附子

斷艾 各一兩 陳皮 藿香 白芷 牡丹皮

藁本 各五錢 丁香 木香 各三錢

右為細末酒糊丸每服三錢子宮冷熱酒下○白濁鹽湯下○

產後積血艾醋煎湯下

壬子丸 此藥服之不過一月有孕試之有效

吳葉莢 白芨 白茯苓 白欬各一兩 人參 桂心

沒藥各四兩 乳香三兩 川牛膝 厚朴各五錢 當歸 石菖蒲

白附子炮去皮各一錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸溫酒或鹽湯下日

進三服用壬子曰鷄犬不聞之處修合有孕毋服無天婦人不

可服

南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血海虛冷久無孕育及數墮胎一

切經候不調崩中漏下積聚諸證

秦茺 人參 蕤本 石斛 甘草各一兩

此方藥品雖多自成一局補氣而不補血而不用白芍行血而

以水旺之且

用丹皮澤 蘭黃卷行 氣而有水枳 香附蒼木川 椒正血有 蚕有京墨 破血有桃石 丹皮溫煑 助肉桂乾姜 細辛引經 則葉本石解 而養陰泰 凡行經而散 溫補而不滯 細而不燥若 再以執易涼 以燥易平 涼行之法也

桔梗

各二兩

京墨

吸醋

木香

桃仁

去皮半炒

糯米升

川芎

當歸

肉桂

乾姜

炮

細辛

牡丹皮

各一兩半

茯苓

二兩

熟地黃

酒蒸

香附子

炒

澤蘭葉

各四兩

川椒

炒去日

山藥

各三兩

蒼朮

米泔浸八兩

大豆黃卷

炒半斤

一方川椒山藥各七錢半

右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯

在下或以醋調和丸如桐子大每服五十丸亦可

石莖丸 治婦人子宮久冷不成孕育及數經障胎月候不勻

崩中漏下七癥八瘕白淫白帶並宜服之

紫石英

天門冬

桂心

川芎

卷柏

烏頭

炮

此藥前方相
去之而餘根
有燥
之功
用色
附之

沙其系月

卷二

熟地黄

辛夷仁

禹餘糧

炒醋

當歸

石斛

各三兩

紫葳

牡蒙

各二兩

粉草

烏鰂骨

燒灰

薯蕷

各一兩半

牛膝

栢子仁

炒

吳茱萸

桑寄生

牡丹皮

人參

細辛

厚朴

續斷

乾姜

炮一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心米飲溫酒任下

益胞湯

治婦人全不產育及斷絕久不產三三十年者

朴硝

牡丹皮

當歸

大黃

蒸一飯久

桃仁

各三兩

細辛

厚朴

姜汁炙

苦梗

赤芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

牛膝

陳皮

各二兩

附子

炮一兩半

蝱蟲

炒焦去翅足

水蛭

炒各十枚

右為末每服六錢水酒各半蠶煎至六分溫服日二服夜一服

此方為專厚
防產者設

溫覆得少汗必下積血與冷赤膿如小豆汁斟酌不盡若力弱
大困不堪者只一二服止如惡物不盡用坐導藥

坐導藥

治婦人全不產及斷續服前證胞湯惡物不盡用此方

皂角

去皮子
一兩

吳茱萸

當歸各一兩

大黃

細辛

五味子

乾姜

炮各一兩

白礬

枯

戎鹽

蜀椒

各半兩

一方無大黃有黃葵花半兩

右為細末以絹袋盛如指狀人婦入陰戶中坐臥任意勿行走
小便時去之一日一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見
病出可十日去之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則
發疼痛須俟病出盡方已不可中輟每日早晚用苦菜煎湯薰
洗之

鳥魚骨原根
赤高蘭茹烏
賊來

癰疽主須用
子和法

不用地黃

不用四物

內藥續生丸

母丁香 附子 肉苳蔻 枯礬 烏魚骨

右為末糊為軟丸綿裹內陰中

治痰塞不孕

丹溪值芝湯 治婦人肥盛無子以身中有脂膜閉塞子宮也宜

先服此調理

當歸酒洗一兩 川芎七錢半 白芍藥 白朮 半夏湯泡

香附 陳皮各一兩 茯苓二兩 甘草半兩

右剉作十貼加生姜三片水煎吞後丸

丹溪茂芝丸

白朮二兩 半夏 麴 川芎 香附子各一兩 茯苓

丹溪深閤春

桂之北而

翁期乃又爲

取
服
日
權

左
明
各
四

其新而爲法

歌耳

要知南界滑石防風羌活之貴

元申
凌翅
半烟
雨各
木商
糸工
錢四
其
草

右爲末。如桐子大。每服八十九粒。溫酒下。

如幸參加進棋臺
○服此藥後却服
○斯片

蠃斯凡歸防風三味

有每服五丸空心酒下加至十丸不妨有娠三月後不可更

服○按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人無與者

若肥人服多者又兼前調理藥而所服丸數十減其五只服五

分無妨也。試有刻。

消脂膜道痰湯

半夏製法
南星炮火

橘紅

以殼土微火炒

滑石
一研細各
錢

川

防風

美酒分各五

齊食圖

卷一 宮冷不孕方

二五

車前子分七

右細切作一服加生薑五片水煎空心服以乾物壓之

一方治胎前婦人稟受甚厚恣於酒食經水不調不能成胎謂之軀脂滿公因塞子宮

南星 半夏 羌活 蒼朮 白芍

防風 滑石

右剉水煎服或導痰湯亦可

○治婢妾不孕

煮附丸 治婢妾多驚情不宜暢經多不調故難孕此方最妙不須便服他藥

香附子不拘多少去毛與麝皮米泔水浸一宿曬乾用土

可與神仙附
括九並駕

妙在多醋意

姑存之試之

米醋砂鍋內煮之。旋添醋旋煮。以極爛為度。取出焙乾為末。仍用醋糊為丸。如桐子大。每服五七十丸。經不調即調。久不孕者亦孕。

一方治婦人妬妄悞夫無子。常服不妬。此即化妬丸也。恐未必驗。

天門冬去心赤黍米去殼微炒薏苡仁去殼炒

右為末。煉蜜丸。桐子大。每服八九十丸。白湯下。

○附斷子法

用白麪麴一升。無灰酒五升。打作糊。煮二升半。用絹帛濾去渣。作三服。候月經將來。日晚下吃一服。天明吃一服。月經即行。終身絕子。○一方用故蠶紙方圓一尺。燒為末。酒飲調服。終身不復懷孕。一云產後酒服之。○又方用油煎水銀。一日方息。空

心服棗核大一丸。永斷孕不損人。○一方四物湯五錢加薑
薑子二錢。於經行後空心溫服。

良方論曰。易曰。天地之大德曰生。然婦人有臨產艱難。或生育
不已而欲斷之。故錄驗方以備用。若服水銀、蜜蟲、水蛭之類。不
惟孕不復懷。且禍在反掌。○薛氏曰。大抵斷產之法。多用峻厲。
往往有不起者。是則產之害。未若斷產之害也。吾聞閭老張羅
峰。太常率恒齋之夫人。俱因服斷產之劑。自謂形體俱怯。遇勞
必病。有由然矣。按夷堅志載。東京女子曰牡丹。以售墮胎藥。生
得惡報。今雖列如上方。以備萬一之用。用者。尚其慎之。

